



Regione Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
(SeSIRCA)

***PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA
PROGRAMMA REGIONALE PER L'AGRICOLTURA COMPATIBILE CON
L'AMBIENTE (REG. CEE 2078/92)
PIANO DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1257/99)***

**NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL
DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE**

(Aggiornamento dicembre 2002)
Il presente documento consta di 292 pagine inclusa la copertina

S O M M A R I O

PRESENTAZIONE	5
1 PREMESSA	6
2 CRITERI ADOTTATI NELLA SCELTA DEI PRINCIPI ATTIVI DA UTILIZZARE PER LA DIFESA DELLE PIANTE.....	6
3 NORME DA SEGUIRE NELLA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA	7
DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE ARBOREE	
4 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELL'ACTINIDIA	9
5 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEGLI AGRUMI	13
6 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELL'ALBICOCCO	21
7 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL CASTAGNO	25
8 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL CILIEGIO.....	29
9 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL FICO	32
10 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA FRAGOLA	33
11 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL KAKI.....	39
12 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL MELO.....	41
13 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL NESPOLO	50
14 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL NOCCIOLINO	51
15 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL NOCE	55
16 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELL'OLIVO	57
17 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL PERO	61
18 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL PESCO.....	69
19 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL SUSINO	79
20 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA VITE PER UVA DA VINO	82
DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE ERBACEE	
21 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELL'AGLIO	87
22 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELL'ASPARAGO.....	90
23 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL BASILICO	92
24 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA BIETOLA DA FOGLIE E DA COSTA	94
25 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL CARCIOFO	96
26 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA CAROTA	100
27 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, BROCCOLETTO DI RAPA E RAVANELLO.....	102
28 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL CETRIOLO, ZUCCHINO E ZUCCA	106
29 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA CIPOLLA.....	111
30 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL FAGIOLINO.....	114
31 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL FAGIOLINO	117
32 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA FAVA DA GRANELLA.....	120
33 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL FINOCCHIO	122
34 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA LATTUGA E DELL'INDIVIA.....	126
35 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA MELANZANA	131
36 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL MELONE E COCOMERO	139
37 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA PATATA.....	147
38 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL PEPERONE.....	153
39 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL PISELLO	159
40 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL POMODORO DA MENSA IN COLTURA PROTETTA	161
41 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL PREZZEMOLO.....	167
42 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA RUCOLA	168
43 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL SEDANO.....	170
44 DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA SPINACIO	174

	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE INDUSTRIALI	
45	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA BARBABETOLA DA ZUCCHERO	176
46	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL POMODORO IN PIENO CAMPO	179
47	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL TABACCO	185
	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE CEREALICOLE	
48	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEI CEREALI MINORI (ORZO, AVENA E SEGALE)	191
49	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL FRUMENTO (TENERO E DURO).....	193
50	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL MAIS.....	195
	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE OLEAGINOSE	
51	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL GIRASOLE	197
	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE FLORICOLE	
52	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL CRISANTEMO	198
53	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL GAROFANO	206
54	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA GERBERA.....	214
55	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL GLADIOLO	221
56	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DEL LILUM	226
57	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA POINSETTIA	233
58	DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLA ROSA	237
	DISERBO INTEGRATO	
59	NORME TECNICHE PER IL DISERBO.....	245
59.1	Premessa	245
59.2	Il controllo integrato delle infestanti nei frutteti, nel vigneto e nell'oliveto.....	246
59.2.1	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo di: Actinidia, Agrumi, Albicocco, Cilegio, Melo, Nocciolo, Noce, Olivo, Pero, Pesco, Susino e Vite.</i>	247
59.3	Il controllo integrato delle infestanti delle colture erbacee e della fragola.....	248
59.3.1	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo dell'aglio.....</i>	250
59.3.2	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo dell'asparago.....</i>	251
59.3.3	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del basilico.....</i>	252
59.3.4	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della bietola da foglie e da costa.....</i>	253
59.3.5	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del carciofo</i>	254
59.3.6	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della carota.....</i>	256
59.3.7	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza e broccoletto di rapa</i>	258
59.3.8	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del cetriolo, della zucca e dello zucchino.....</i>	259
59.3.9	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della cipolla</i>	260
59.3.10	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del fagiolino</i>	261
59.3.11	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del fagiolo</i>	262
59.3.12	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della fava da granella</i>	263
59.3.13	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del finocchio.....</i>	264
59.3.14	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della lattuga e dell'indivia</i>	265
59.3.15	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della melanzana</i>	266
59.3.16	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo melone e del cocomero.....</i>	267
59.3.17	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della patata</i>	268
59.3.18	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del peperone.....</i>	270
59.3.19	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del pisello</i>	271
59.3.20	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del pomodoro da mensa in coltura protetta...</i>	272
59.3.21	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del prezzemolo</i>	273
59.3.22	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della rucola</i>	274
59.3.23	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del sedano</i>	275
59.3.24	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo dello spinacio</i>	276
59.3.25	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della barbabietola da zucchero</i>	277

59.3.26	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del pomodoro in pieno campo.....</i>	280
59.3.27	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del tabacco</i>	282
59.3.28	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo dell'orzo, dell'avena e della segale</i>	283
59.3.29	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del frumento</i>	284
59.3.30	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del mais</i>	286
59.3.31	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del girasole.....</i>	288
59.3.32	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo della fragola.....</i>	290
59.4	Il controllo integrato delle infestanti delle colture floricolte	291
59.4.1	<i>Principi attivi consentiti nel diserbo del crisantemo, garofano, gerbera, gladiolo,lilium, poinsettia, rosa</i>	291

Presentazione

Negli ultimi anni si è andata affermando, con sempre maggiore vigore, l'esigenza di ottenere prodotti agroalimentari salubri e provenienti da coltivazioni condotte con tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, rispettose della salute degli agricoltori e dei consumatori. Per il perseguitamento di questa finalità, l'Amministrazione Regionale, in accordo con quelle che sono le linee programmatiche della politica agricola comunitaria e nazionale ha avviato azioni specifiche a supporto dell'agricoltura sostenibile, operando in modo da:

- porre sotto controllo il consumo dei fitofarmaci per razionalizzarne l'uso e limitarne quindi le quantità impiegate;
- definire un quadro di riferimento programmatico ed operativo capace di raccordare ed integrare le azioni curate dai vari soggetti istituzionali e sociali operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione ed in quello dell'informazione e della consulenza;
- contribuire alla creazione dei presupposti organizzativi affinché tutte le componenti interessate esprimano un'azione incisiva e permanente nei riguardi dei problemi connessi all'impiego dei fitofarmaci.

Le Norme tecniche per la difesa fitosanitaria integrate ed il diserbo delle colture rappresentano la sintesi di tutte le indicazioni fornite dai tecnici dei Servizi di Sviluppo Agricolo nel campo della consulenza fitosanitaria. Esse sono oggetto di continuo aggiornamento e costituiscono le prescrizioni alle quali devono attenersi tutti gli agricoltori che attuano il Piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

Il presente aggiornamento è l'ottavo in ordine di tempo che viene effettuato dal 1997, anno di prima pubblicazione, e rappresenta l'impegno continuo che l'Amministrazione regionale, attraverso il SeSIRCA, ha per la diffusione sul territorio campano di tecniche produttive aggiornate ed a sempre minore impatto ambientale, che vedono quale momento centrale la promozione della difesa fitosanitaria integrata. Alla dott.ssa Daniela Carella ed al dott. Bruno Danise va il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso.

*Vincenzo Aita
Assessore regionale all'Agricoltura*

1 Premessa

Il “Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata” si propone di razionalizzare l’impiego dei prodotti fitosanitari sia sotto il profilo del numero di trattamenti da effettuare, che sotto quello delle scelta dei prodotti da utilizzare, pervenendo conseguentemente ad una sensibile riduzione del loro uso e dell’impatto ambientale derivante.

Le Norme tecniche per la difesa fitosanitaria integrate ed il diserbo delle colture sono state formulate in accordo a quanto concordato tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e la Commissione della Comunità Europea per quanto attiene l’attuazione in Campania del Reg. CEE 2078/92 e del Reg CE 1257/99.

Qualsiasi deroga alle presenti norme (in termini di giustificazione degli interventi, principi attivi, dosi d’impiego, ecc.) deve avere validità temporanea ed essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione Campania in relazione a particolari condizioni dell’azienda e solo in caso di eventi eccezionali.

Qualora durante l’annata agraria fossero registrati nuovi principi attivi, il Servizio Fitosanitario della Regione Campania potrà autorizzarne l’impiego, per l’anno in corso, a condizione che sia stato acquisito il parere di conformità da parte del Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale e che i nuovi formulati non siano classificati “T”, “T+” o “XN”.

2 Criteri adottati nella scelta dei principi attivi da utilizzare per la difesa delle piante

Le colture per le quali sono state redatte le indicazioni tecniche sono le seguenti:

Colture arboree: actinidia, agrumi, albicocco, castagno, ciliegio, fico, fragola, kaki, melo, nespolo, nocciolo, noce, olivo, pero, pESCO, susino, vite per uva da vino.

Colture ortive: aglio, asparago, basilico, bietola da foglie e da costa, broccoletto di rapa, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cipolla, cocomero, fagiolino, fagiolo, fava da granella, finocchio, indivia, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro da mensa, prezzemolo, rucola, sedano, spinacio, zucca, zucchino.

Colture industriali: barbabietola da zucchero, pomodoro in pieno campo, tabacco.

Colture cerealicole: avena, frumento tenero e duro, mais, orzo, segale.

Colture oleaginose: girasole.

Colture floricolore: crisantemo, garofano, gerbera, gladiolo, lily, poinsettia, rosa.

La scelta dei principi attivi da impiegare, riportati nelle tabelle allegate, è stata effettuata sulla base delle seguenti valutazioni:

- l’efficacia nei confronti dell’avversità da controllare;
- la selettività per la coltura;
- la selettività nei confronti degli organismi utili;
- il/i principio/i attivo/i appartenente/i alla classe tossicologica più bassa tra quelli registrati per la coltura e l’avversità;
- il minor impatto per la salute dell’uomo e per l’ambiente (residualità sulle produzioni e nell’ambiente, mobilità nel suolo e conseguente rischio di inquinamento delle falde, ecc.);
- i tempi di carenza in funzione dell’epoca di raccolta.

Inoltre non sono stati autorizzati:

- i fitoregolatori;
- il bromuro di metile nella geodisinfestazione;
- i prodotti ormonici nel diserbo chimico.

3 Norme da seguire nella difesa fitosanitaria integrata

In linea generale, la corretta gestione fitosanitaria di un agroecosistema inizia dalla corretta impostazione di tutte le pratiche agronomiche necessarie alla sua conduzione, a partire dall’impianto, e che possono giocare un ruolo nel limitare l’insorgere e/o il diffondersi delle diverse avversità che possono colpire le singole colture. In particolare nella scelta dei mezzi di intervento vanno date le seguenti priorità:

- scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità;
- impiego di materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;
- adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi (ad es. ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, ecc.);
- impiego di mezzi fisici e meccanici;
- impiego di mezzi biologici.

Nella scelta dei mezzi d’intervento per la difesa fitosanitaria delle colture va data sempre la priorità ai mezzi agronomici sopra riportati, ai mezzi fisici, meccanici e biologici prima di intervenire con il mezzo chimico. Quest’ultimo va impiegato solo nei casi in cui il fitofago raggiunga la soglia di intervento o nei casi in cui si realizzino le condizioni di infezione da parte di un patogeno, la cui presenza è accertata in un determinato agroecosistema e la pianta ospite è suscettibile all’infezione.

I principi attivi da utilizzare vanno scelti esclusivamente tra quelli riportati nelle tabelle indicate; per la loro scelta si fa obbligo di:

- tenere nella dovuta considerazione tutti gli interventi fitosanitari precedentemente effettuati per evitare di ingenerare fenomeni di resistenza;
- escludere i formulati classificati “Molto Tossici, Tossici o Nocivi” (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati “Irritanti” o “Non classificati” (ex III e IV classe);
- valutare attentamente le caratteristiche dei formulati e la loro miscibilità;
- utilizzare le dosi di impiego indicate in etichetta, preferendo quelle inferiori previste per l’avversità da controllare;
- rispettare i limiti indicati nelle note riportate nelle tabelle indicate relativi al numero dei trattamenti da effettuare, che sono riferiti a tutto il ciclo colturale;
- utilizzare i principi attivi solo per le avversità per i quali sono indicati;
- tener presente che l’uso dei bagnanti e degli adesivanti è ammesso purché regolarmente registrati.

È ammesso l’uso dei principi attivi previsti dal Reg. Cee 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia, con esclusione di quei formulati classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi.

Laddove possibile ricorrere a trattamenti localizzati sulle parti maggiormente infestate, in modo da limitare i danni all’entomofauna utile.

L’installazione delle trappole è obbligatoria in tutti i casi in cui si fa specifico riferimento ad esse per la valutazione della soglia di intervento.

Tutto quanto indicato nella colonna “LIMITAZIONI D’USO E NOTE” delle tabelle allegate è da intendersi obbligatorio.

Tutto quanto evidenziato con il retinato nella colonna “EPOCA E MODALITÀ D’INTERVENTO” è da ritenersi obbligatorio.

Per il controllo di avversità non previste nel presente documento o per eventuali modifiche ai criteri di intervento a seguito dell’instaurarsi di problematiche fitosanitarie anomale, il Servizio Fitosanitario della Regione Campania provvederà ad impartire le opportune disposizioni.

Il controllo delle infestanti va attuato attenendosi tassativamente a quanto indicato nelle norme tecniche relative al diserbo.

I trattamenti fungicidi in post-raccolta sono permessi allo scopo di minimizzare gli impieghi di fungicidi in pre-raccolta per il controllo delle malattie di conservazione solo quando previsti dalle tabelle indicate e quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i frutti trattati in pre-raccolta con fungicidi per il controllo dei marciumi da conservazione non possono essere trattati in post-raccolta.

Non è ammesso l’impiego di fitoregolatori ad eccezione di quelli riportati nelle norme tecniche specifiche di coltura.

I prodotti fitosanitari autorizzati con le “Norme tecniche” 2001-2002, ma esclusi dalle presenti “Norme”, potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti e registrate nel “Registro dei trattamenti effettuati e stato di magazzino” alla data dell’entrata in vigore delle presenti “Norme”. Tale autorizzazione è valida solo per l’annata agraria 2002-2003.”.

4 Difesa fitosanitaria integrata dell'actinidia

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Tumore radicale (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		
Maculatura batterica (<i>Pseudomonas viridisflava</i>)	Agronomico: • asportare e distruggere i rami colpiti; • disinfezionare accuratamente i grossi tagli di potatura e le ferite prodotte da eventi meteorici avversi; • evitare di potare in periodi umidi e piovosi e disinfezionare gli attrezzi da pota nel passaggio da una pianta all'altra. Chimico: • intervenire, solo in caso di accertata presenza, alla caduta delle foglie e dopo la potatura.		• composti rameici

AVVERTISIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME			
Marciume delle talee e delle piantine (<i>Rhizoctonia solani</i>) Marciume del colletto (<i>Phytophthora</i> spp.)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare l'impianto in terreni ove di recente si sia manifestata la malattia; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • attuare accurate sistemazioni idraulico-agrarie per evitare i ristagni d'acqua; • evitare frequenti lavorazioni e lesioni al colletto delle piante; • nel porre a dimora le piante rispettare la profondità che queste avevano nel vivaio; • non posizionare i gocciolatori vicino al fusto delle piante. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare trattamenti localizzati alla base delle piante infette alla ripresa vegetativa e, eventualmente, a distanza di due o tre mesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • fosfati-alluminio 	
Marciume radicale (<i>Armillariella mellea</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare un accurato sgrondo delle acque dal suolo ed evitare per quanto possibile ferite all'apparato radicale; • non impiantare la coltivazione in terreni che abbiano di recente ospitato piante affette da questa malattia; • evitare i terreni eccessivamente compatti ed a reazione alcalina. 		

AVVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Botrite (f.a.: <i>Botryotinia fuckeliana</i> ; f.c.: <i>Botrytis cinerea</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenere un eccessivo sviluppo vegetativo, mediante concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • evitare l'irrigazione soprachioma; • favorire un'adeguata circolazione di aria ed una buona penetrazione della luce nella vegetazione con idonei interventi di potatura. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo nelle annate umide e piovese o negli impianti colpiti nell'anno precedente, a caduta petali, per le produzioni destinate ad una prolungata frigo-conservazione, in pre-raccolta. 		<p>Al massimo 2 trattamenti annui, contro quest'avversità.</p>
FITOFAGI	<p>Cocciniglia bianca delle drupacee (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)</p>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protezione del parassitoide specifico <i>Encarsia perlasei</i>, evitando l'uso di prodotti a largo spettro, o sua introduzione nel frutteto mediante rami con presenza di cocciniglie parassitizzate (metodo del bouquet), a fine inverno. <p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spazzolatura del fusto e delle branche per rimuovere le incrostazioni e mettere allo scoperto i follicoli delle femmine svernanti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire, alla presenza di forme vive sui frutti, nella fase di migrazione delle neanidi di III generazione, in settembre, o alla migrazione delle neanidi di I generazione (fine aprile-maggio), limitando, ove possibile, il trattamento alle sole piante colpite. • buprofezin (1) 	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago; localizzati sulle piante infestate.</p>

AVVERTERITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , ed altre)	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• di norma, il trattamento per il controllo della cocciniglia bianca è efficace anche contro le cicaline;• intervenire solo al superamento della soglia di intervento di almeno 5 forme mobili per foglia.	• buprofezin	Ammesso 1 solo trattamento annuo contro questo fitofago.
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• intervenire solo in caso di infestazioni in atto	• etofenprox	Ammesso 1 solo trattamento annuo contro questo fitofago.
NEMATODI Nematode galligeno delle radici (<i>Meloidogyne hapla</i> ; <i>M. arenaria</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente e controllare comunque lo stato fitosanitario delle radici per escludere la presenza di galle;• evitare il ristoppio o l'impianto in appezzamenti che abbiano ospitato altre specie suscettibili.		

5 Difesa fitosanitaria integrata degli agrumi

AVVERTERITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI Piticchia Batterica (<i>Pseudomonas syringae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal tardo autunno, fino a primavera inoltrata, periodi nei quali è più alto il rischio che si verifichino grandinate, gelate, forti venti, ecc., adottare idonee misure per la protezione dell'agrume (copertura con reti, con incannucciati o altro). <p>Chimico</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in autunno-inverno, dopo il verificarsi di eventi meteorici favorevoli all'infezione (grandinate, gelate, forti venti, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici 	<p>(1) Trattamenti alla base del tronco delle piante vicine a quelle infette.</p> <p>(2) Non registrato su clementine.</p> <p>(3) Trattamenti circoscritti alle parti interessate dalla malattia. Al massimo un intervento annuo, da effettuarsi nei periodi di massima piovosità (preferibilmente in primavera).</p>
CRITTOGAME Gommosi del colletto, Marciume radicale, Allupatura (<i>Phytophthora</i> spp.)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'impianto evitare terreni pesanti e mal drenati; adottare portainnesti resistenti (es. arancio amaro) è da evitare l'eliminazione delle parti infette nella zona del colletto in quanto, attraverso le ferite prodotte, si esporrebbe la pianta ad attacchi di Mal secco fulminante, <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> evitare ristagni idrici in prossimità del colletto. alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> poltiglia bordolese (1) fosetyl-alluminio (2) (3) 	

AVVERTISITA' DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal Secco <i>(Phoma tracheiphila)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estirpare le ceppaie di piante infette; • tagliare e bruciare i rami infetti (il taglio va effettuato almeno 30 cm al di sotto della parte secca, avendo cura di disinfezionare gli attrezzi utilizzati e di proteggere le superfici di taglio con appositi masticci); • evitare le lavorazioni al terreno da metà autunno a primavera avanzata; • non praticare reinnesti su piante infette; • dal tardo autunno, fino a primavera inoltrata, periodi nei quali è più alto il rischio che si verifichino grandinate, gelate, forti venti, ecc., e comunque più elevata è la possibilità di infezioni da Mal secco, adottare idonee misure per la protezione del limoneto (copertura con reti, con incannucciati o altro); • eseguire le operazioni di potatura preferibilmente nella tarda primavera e con l'occasione eliminare i polloni che si sviluppano al disotto del punto d'innesto; • non eccedere nelle concimazioni azotate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel periodo compreso tra ottobre ed aprile e solo in seguito ad eventi meteorici avversi (grandinate, gelate, forti venti, ecc.). 	<p>Questo patogeno rappresenta un problema soprattutto per il limone.</p> <p>(4) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità con uno di questi p.a..</p>	
Fumaggini <i>(Capnodium spp., Limacinia spp., Pleosphaeria spp., etc.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvedere all'areazione della chioma con la potatura; • contenere le concimazioni azotate. 		

AVVERTERITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Cocciniglie 1. Diaspini: Cocciniglia rossa forte (<i>Aonidiella aurantii</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arieggiamento della chioma; • non eccedere nelle concimazioni azotate. <p>Campionamento: da effettuarsi nei periodi immediatamente precedenti l'inizio di nuove generazioni (marzo-aprile; giugno; settembre); prelevare 4 rametti di 10 cm per pianta sul 5-10% delle piante, per un totale di almeno 100 rametti.</p> <p>Chimico</p> <ul style="list-style-type: none"> • la soglia di intervento è pari a 1 adulto/cm di rametto o 3-5 forme giovanili (neanidi)/foglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • oli minerali leggeri ad alto grado di insulfonabilità (oltre il 92%) 	<ul style="list-style-type: none"> • oli minerali leggeri ad alto grado di insulfonabilità (oltre il 92%)

AVVERTERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
2. Coccidi:	<p>Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)</p> <p>Cocciniglia piatta e C. marezzata degli agrumi (<i>Coccus hesperidum</i> e <i>C. pseudomagnolarium</i>)</p> <p>Cocciniglia elmetto (<i>Ceroplastes sinensis</i>)</p>	<p>Campionamento: ad inizio settembre prelevare 4 rametti di 10 cm per pianta sul 5-10% delle piante, per un totale di almeno 100 rametti.</p> <p>Chimico</p> <ul style="list-style-type: none"> la soglia di intervento è pari a 1 femmina per 10 cm di rametto o a 3-4 neanidi per foglia; nel caso di infestazioni in atto nel periodo primaverile, il trattamento va effettuato tra fine luglio ed inizio agosto, quando il 90-95% delle femmine presenta uova schiuse, o ad inizio settembre nel caso della Cocciniglia elmetto. 	<p>(5) Il trattamento con oli minerali attivati va effettuato per non più di una volta all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
3. Pseudococcidi:	<p>Cotonello citrofilo (<i>Pseudococcus calceolariae</i>)</p> <p>Cotonello degli agrumi (<i>Planococcus citri</i>)</p>	<p>Biologico</p> <p>A partire dal mese di aprile, alla comparsa delle prime forme sui frutti, effettuare lanci di entomofagi ed eseguire i campionamenti previsti per l'uso del mezzo chimico.</p> <p>Chimico</p> <p>Campionamento: quando i frutti hanno 2 cm di diametro vanno controllati 10 frutti/pianta su almeno 10 piante/ha;</p> <ul style="list-style-type: none"> la soglia di intervento è pari al 10-15% dei frutti infestati. 	<p>(5) <i>Leptomastix dactylopii</i></p> <p><i>Cryptolaemus montrouzieri</i></p> <p>• oli minerali leggeri ad alto grado di insulfonabilità (oltre il 92%) eventualmente attivati con basse dosi di fenitrotion (5)</p>

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi: Afide verde degli agrumi (<i>Aphis citricola</i>) Afide bruno degli agrumi (<i>Taxoptera aurantii</i>) Afide delle malvacee e delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> non eccedere nelle concimazioni azotate. <p>Campionamento: alla ripresa vegetativa si valuta la percentuale di infestazione su almeno 100 germogli prelevati dal 10% delle piante.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> soglia di intervento: 10% (5% per clementine e mandarino) dei germogli infestati per l'afide verde; 25% per gli altri due afidi 	<ul style="list-style-type: none"> pirimicarb 	<p>È consentito al massimo un trattamento annuo contro questi fitomizi.</p>
Tignola della zagara (<i>Prays citri</i>)	<p>Monitoraggio degli adulti con trappole a feromone negli agrumeti in cui negli anni precedenti si sono verificate infestazioni e si ritiene dover ricorrere al controllo chimico.</p> <p>Campionamenti: dopo le prime catture esaminare almeno cento bocci fiorali e/o germogli sul 10% delle piante presenti.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> soglia di intervento: <ul style="list-style-type: none"> – pre-fioritura: 10-15% dei bocci fiorali infestati; – dalla fioritura 50% dei germogli infestati 	<ul style="list-style-type: none"> fentrotion (6) • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> 	<p>Intervenire chimicamente soltanto se necessario con 1 unico trattamento annuo.</p> <p>(6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• raccogliere e distruggere i frutti attaccati;• non lasciare sulla pianta frutti in avanzato stato di maturazione. Chimico <ul style="list-style-type: none">• Per l'applicazione del controllo con esche proteiche monitorare gli adulti con trappole innescate al trimedure a partire dal mese di luglio (7); • la soglia di intervento è pari a 20 adulti/ trappola /settimana.• Per i trattamenti a tutta chioma (8) (9) campionare almeno 100 frutti a caso sul 5-10% delle piante; • la soglia di intervento corrisponde alle prime punture osservate sul 2-3% dei frutti del campione.	<ul style="list-style-type: none">• esche proteiche + dimetato (7)• triclorfon (8)• diazinone (9)	<p>(7) I trattamenti con esche proteiche, comunque di complessa gestione, vanno localizzati solo su una parte della chioma o, se a tutta chioma, su piante alterne o su filari alterni. Al massimo un trattamento annuo con questo p.a. a prescindere dal fitofago.</p> <p>(8) Al massimo 1 trattamento con triclorfon a prescindere dal fitofago ed esclusivamente in alternativa al diazinone.</p> <p>(9) Autorizzato solo su arancio, pompelmo e pomelo. Al massimo 1 trattamento all'anno a prescindere dal fitofago ed esclusivamente in alternativa al triclorfon.</p>
Acari Ragnetto rosso tessitore (<i>Tetranychus urticae</i>) Panonic o Ragnetto rosso degli agrumi (<i>Panonychus citri</i>) Acaro rugginoso (<i>Aculops pelekassi</i>) Acaro dell'argentatura (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Campionamento: da fine inverno esaminare 100 foglie prese a caso da 10 piante/ha e/o 100 frutti scelti anch'essi a caso sempre da 10 piante/ha. Chimico: Va segnalato che diversi acari predatori possono contribuire al contenimento naturale dei ragnetti rossi, se non limitati dall'uso irrazionale di insetticidi ed acaricidi. Soglia di intervento: 40-50% di foglie con infestazione attiva o 5% di frutti infestati.	<ul style="list-style-type: none">• exitiazox (10)• clofentezine (10)• benzossimato (12)• tebufenpirad• feniproximate (11)• bromopropilato• fenzazaquin (12)• abamectina (12)• oli minerali leggeri ad alto grado di insulfonabilità (oltre il 92%)	<p>Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal principio attivo utilizzato solo in caso di insufficiente controllo biologico da parte degli ausiliari.</p> <p>(10) Prodotto non autorizzato per il controllo dell'Eriofide rugginoso.</p> <p>(11) Non registrato su mandarino.</p> <p>(12) Questi 3 p.a. vanno impiegati in alternativa tra loro.</p>

AVVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi			(13) Intervenire eventualmente anche in maniera localizzata; far seguire il trattamento da lanci incolativi di <i>Cales noacki</i> .
Aleirode fiocoso degli agrumi (<i>Aleyrothrixus floccosus</i>)	Agronomico: • razionalizzare gli interventi irrigui; • non eccedere nelle concimazioni azotate; • effettuare un accurato lavaggio della chioma in caso di abbondante melata.		
Dialeurode degli agrumi (<i>Dialeurodes citri</i>)			
Aleirode giapponese degli agrumi (<i>Parabemisia myricae</i>)	Biologico: • lanci degli ausiliari specifici Campionamento: alla comparsa di melata e fumagine esaminare 100 foglie prese a caso da 10 piante/ha;	• <i>Cales noacki</i>	
	Chimico: L'Aleirode fiocoso degli agrumi è di norma sufficientemente controllato dal parassitoide <i>Cales noacki</i> .		• oli minerali leggeri ad alto grado di insulfonabilità (oltre il 92%) (13)
			• la soglia di intervento è pari al 10-15% delle foglie del campione infestate con forme non parassitizzate.

AVVERTERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fillonatrice degli agrumi <i>(Phyllocoptes citrella)</i>	<p>Piante in formazione</p> <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razionalizzare gli interventi irrigui; • non eccedere nelle concimazioni azotate; • limitare ed anticipare la potatura. <p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 2-3 anni dalla messa a dimora, da inizio giugno fino a tutto ottobre, proteggere la chioma con tessuto non tessuto. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo su piante giovani ed al manifestarsi dei primi attacchi 	<p>azadiractina</p> <p>lufenuron (14)</p> <p>tebufenozide (15)</p> <p>esaflumuron (16)</p>	<p>Al massimo 4 trattamenti annui per il controllo di questo fitofago.</p> <p>(14) Registrato solo su arancio, limone e mandarino; effettuare al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(15) Al massimo 3 trattamenti annui a prescindere dal fitofago.</p> <p>(16) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. Non autorizzato su Arancio amaro, Bergamotto, Cedro, Chinotto, Kumquat, Limetta, Pomele, Pompelmo e Tangerino.</p>

6 Difesa fitosanitaria integrata dell'albicocco

AVVERTERITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
PPV – Virus della violettatura (Sharka)	Decreto di Lotta Obbligatoria del 26/11/92 Agronomico: • estirpare e distruggere le piante infette.		(1) Al massimo indipendentemente dall'avversità con uno di questi p.a.
CRITTOGAME Corineo (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	Agronomico: • evitare i ristagni idrici e limitare le concimazioni azotate; • eliminare e bruciare i rami infetti. Chimico: • a caduta foglie; • un secondo trattamento alla scamicatura in impianti gravemente colpiti.	• composti rameici ziram (1) tiram (1)	(2) Al massimo 2 interventi annui con gli IBE indipendentemente dall'avversità.
Oidio (<i>Podosphaera oxyacanthae</i> var. <i>tridactyla</i>)	Chimico: • alla scamicatura-ingrossamento frutti intervenire in ambienti molto umidi ed in impianti di solito colpiti; • alla comparsa dei primi sintomi andranno effettuati eventuali successivi interventi.	• zolfo bitertanolo (2) • miclobutanil (2) fenbuconazolo (2) tebuconazolo (2)	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Moniliosi delle drupacee <i>(Monilia laxa, M. fructigena)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare irrigazioni equilibrate ed assicurare sempre il drenaggio delle acque in eccesso; • limitare le concimazioni azotate; • durante la fase di riposo vegetativo asportare e bruciare le mummie ed i rami infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a bottoni rosa; • un secondo trattamento non oltre la fase di post-allegagione al verificarsi di condizioni predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • polisolfuro di bario (3) • iprodione (4) • procimidone (4) • clozolinate (4) • biterianolo (5) • tebuconazolo (5) • fenbuconazolo (5) • fludioxonil + cyprodinil (6) • fenexamid 	<p>Al massimo 2 interventi annui contro questa avversità.</p> <p>(3) In caso di concomitante presenza di cocciniglie.</p> <p>(4) Ammessi fino alla scamicatura.</p> <p>(5) Al massimo 2 interventi annui con gli IBE, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(6) Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERTISITA' DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITA' DELL'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Anarsia o Cidia dei germogli (<i>Anarsia lineatella</i>)	<p>Installare le trappole a feromoni a fine fioritura nel caso si intendano utilizzare gli IGR.</p> <p>Campionamenti: su 100 germogli/ha e/o 100 frutti/ha scelti a caso sul 5-10% delle piante, dopo le prime catture degli adulti o, in assenza di trappole, al verificarsi dei primi attacchi.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● intervenire con gli IGR quando si ha un sensibile incremento nelle catture degli adulti. Se si impiegano i fosforgamici attenersi alla seguente soglia: ● soglia di intervento: 3% di infestazione attiva calcolata applicando la seguente formula: soglia di Intervento = (% di germogli infestati/3 + % di frutti infestati/2); 		<p>(7) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago</p> <p>(8) Al massimo 1 trattamento annuo in pre raccolta indipendentemente dal fitofago</p>

AVVERTISITA' DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITA' DELL'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia di S. Josè <i>(Quarraspidiotus perniciosus)</i>	<p>Chimico:</p> <p>Soglia d'intervento: presenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • di norma sulle forme svernanti, che sono facilmente aggredibili; • proseguire nelle osservazioni a partire dalla fase di frutticini in sviluppo ed intervenire in presenza delle prime infestazioni in modo che la cocciniglia non passi sui frutti. 	<ul style="list-style-type: none"> • polisolfuro di bario • oli minerali 	
Cocciniglia bianca <i>(Pseudaulacaspis pentagona)</i>	<p>Campionamenti: vanno esaminati a fine agosto-settembre, in corrispondenza dell'ultima comparsa annuale di neanidi, i tronchi, le branche ed i rami di 100 piante/ha. Tale campionamento va effettuato anche nella fase di sfioritura-allegagione.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduzione di rami contenenti cocciniglie parassitizzate da <i>Encarsia berlesei</i>. <p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di infestazioni localizzate intervenire con spazzolature delle parti infestate. <p>Chimico:</p> <p>Soglia di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10-15% in fase di sfioritura-allegagione; • 20-30% nel periodo fine agosto-settembre. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Encarsia berlesei</i> • cocciniglie <ul style="list-style-type: none"> • polisolfuro di bario • oli minerali 	

7 Difesa fitosanitaria integrata del castagno

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI Tumore batterico (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	Agronomico: • adottare ampie rotazioni (4-5 anni); • non realizzare vivai in terreni contaminati.		
CRITTOGAME Cancro corticale (<i>Cryphonectria parasitica</i>)	Agronomico: • proteggere gli innesti con impacchi di torba, terra o mastici protettivi. Meccanico: • asportare chirurgicamente i cancri. Biologico: • ricorrere a ceppi ipovirulenti. Chimico: • disinfezione la zona tagliata con composti rameici	• composti rameici	

AVVERTISITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal dell'inchiostro <i>(Phytopathora cambivora, P. cinnamomi)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente; impiegare portainnesti poco suscettibili; evitare lesioni all'apparato radicale; rimuovere i primi focolai d'infezione. <p>Fisico-meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ricorrere alla sconatura invernale, per esporre il micelio alle basse temperature, e contemporaneamente intervenire con il mezzo chimico. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare spennellature. composti rameici 		
Marciumi radicali <i>(Armillaria mellea e Rosellinia necatrix)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> evitare i ristagni idrici con adeguate sistemazioni del terreno; effettuare concimazioni equilibrate a seguito di analisi del terreno non più vecchie di cinque anni; rimuovere le piante e tutte le radici infette. 		
Seccume fogliare o "fersa" <i>(Mycosphaerella maculiformis)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> eseguire razionali potature. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire a fine estate-inizio autunno, solo in caso di gravi infezioni. composti rameici 		

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Carie del legno <u>Carie bianca (<i>Stereum hirsutum</i>, <i>Phomes igrarius</i>)</u> <u>Carie bruna (<i>Polyporus sulphureus</i>, <i>Fistulina hepatica</i>)</u>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">nella fase di riposo vegetativo eliminare dai tronchi e dalle grosse branche le parti di legno alterate, disinfeettando le superfici di taglio e ricoprendole con mastici protettivi.		
Muffe dei frutti (<i>Penicillium</i> spp., <i>Ciboria batschiana</i> , <i>Phomopsis endogena</i>)	Fisico: <ul style="list-style-type: none">mantenere i locali di conservazione asciutti e con temperature basse per il controllo del <i>Penicillium</i>. Agronomico: <ul style="list-style-type: none">a fine estate-inizio autunno assicurare una pronta raccolta delle castagne evitandone la lunga permanenza sul terreno.		
Alterazioni del POST-RACCOLTA Marciume nero (<i>Racodidella castanea</i>), Muffa verde azzurra (<i>Penicillium crustaceum</i> , <i>P. expansum</i>), Mummificazione gessosa (<i>Phoma endogena</i>), ecc.	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">curatura: immergere il prodotto in acqua addizionata a fermenti lattici, a temperatura intorno ai 15°C per 3-5 gg.,sterilizzare il prodotto in acqua calda a 50°C per 45 min. (obbligatoria per il prodotto da esportare).		

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Cidie <u>Tortrice precoce</u> (<i>Pammene fasciana</i>), <u>Tortrice media</u> (<i>Cydia fagiglandana</i>) <u>Tortrice tardiva</u> (<i>Cydia splendana</i>) Balanino (<i>Curculio elephas</i>)	<p>Mecanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccogliere e distruggere i frutti che cadono prematuramente. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare che le castagne raccolte in sacchi o in andane, prima del trasporto in magazzino, siano lasciate in campo. È opportuno sistemarle su aree appositamente cementate, al fine di evitare la diffusione delle larve nel terreno. 		

8 Difesa fitosanitaria integrata del ciliegio

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME			
Monilliosi <i>(Monilia laxa, M. fructigena)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare i ristagni idrici; • limitare le concimazioni azotate; • eseguire un'accurata potatura verde; • asportare e bruciare le mummie ed i rami infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in periodo pre-fiorale, solo su cv molto suscettibili, al verificarsi di condizioni meteorologiche predisponenti (elevati valori di umidità); • intervenire in post-allegagione-invaiatura (3). 	<ul style="list-style-type: none"> • iprodione (1) • biterfanolo (2) • fenbuconazolo (2) • propiconazolo (2) • tebuconazolo (2) • fenexamid 	<p>(1) Ammesso fino alla scamicciatura.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti annui con gli IBE, a prescindere dall'avversità.</p> <p>(3) In questa fase è ammesso un solo trattamento. Un secondo intervento è autorizzato al persistere di condizioni meteorologiche predisponenti.</p>
Corinneo <i>(Clasterosporium carpophilum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare i ristagni idrici; • limitare le concimazioni azotate; • eseguire un'accurata potatura verde. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in annate molto piovose intervenire alla ripresa vegetativa; • in caso di attacchi gravi si consiglia un ulteriore trattamento nella fase di caduta delle foglie. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • ziram (4) • tiram (4) 	<p>(4) Al massimo indipendentemente dall'avversità con uno di questi p.a.</p>

AVVERTISITA DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Mosca delle ciliege (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	<p>A fine aprile installare trappole cromotropiche gialle o chemiotropiche innescate con il 3-5% di sali ammoniacali.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alle prime catture; • intervenire alle prime catture e con frutti pienamente sviluppati. 	<ul style="list-style-type: none"> • esche proteiche con dimetoato (5) • diazinone (6) • triclorfon (6) • etofenprox (6)(7) 	<p>(5) Al massimo 2 interventi annui.</p> <p>(6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(7) Da impiegare in pre-raccolta.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afide nero (<i>Myzus cerasi</i>)	Campionamento: esaminare 100 germogli/ha prelevati a caso sul 5-10% delle piante a partire dalla fase di bottoni bianchi. Chimico: • Intervenire al superamento della soglia d'intervento: 3% di germogli infestati.	<ul style="list-style-type: none"> • piretro (8) • pirimicarb • imidacloprid (9) 	(8) Valido in prossimità della raccolta. (9) Al massimo 1 trattamento annuo nella fase di bottoni rosa ed in zone in cui si sono verificate gravi infestazioni.

9 Difesa fitosanitaria integrata del fico

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FMV - Virus del Mosaico del Fico	Agronomico: • impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente.		
CRITTOGAME Cancro Rameale (<i>Phomopsis cinerascens</i>)	Agronomico: • eliminare chirurgicamente i rami infetti; • disinfezare le superfici di taglio e delle ferite con mastici. Chimico: • in coincidenza di grandinate o in autunno.	• composti rameici	
FITOFAGI Cocciniglie (<i>Ceroplastes rusci</i> , <i>Mytilococcus conchiformis</i> , <i>Chrysomphalus dicyospermi</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>P. ficus</i>)	Chimico: • solo in caso di gravi infestazioni.	• oli minerali	

10 Difesa fitosanitaria integrata della fragola

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Maculatura angolare (<i>Xanthomonas fragariae</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• allontanare e distruggere i residui vegetazione;• adottare ampie rotazioni;• effettuare concimazioni equilibrate;• impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente.		
CRITTOGAME Oidio (<i>Sphaerotheeca macularis</i> , <i>Odium fragariae</i>)	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• circa dopo 10 gg. dalla crisi di trapianto. Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• eseguire la sfogliatura;• limitare le concimazioni azotate.	<ul style="list-style-type: none">• composti rameici	Al massimo 4 interventi chimici per ciclo culturale contro questa avversità. (1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. Il fenarimol è ammesso solo fino alla prima fioritura.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Midollo rosso (<i>Phytophthora fragariae</i>) Marciume del colletto (<i>Phytophthora cactorum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente; raccogliere e distruggere le piante infette; evitare i ristagni idrici in prossimità del colletto. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> pre-trapianto (disinfezione delle piantine); post-trapianto. 	<ul style="list-style-type: none"> propanocarb fosetyl-alluminio diclofluanide (2) 	<p>Ammessi 2 trattamenti per ciclo culturale per controllo di questa avversità.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti in autunno e primavera e non usando dosi maggiori di 80 g/ha per problemi di fitotossicità.</p>
Muffa grigia (f.a. <i>Botryotinia fuckeliana</i> f.c. <i>Botrytis cinerea</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare cultivar poco suscettibili; adottare idonei sesti d'impianto; arieggicare i tunnel; allontanare i frutti colpiti; effettuare concimazioni equilibrate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di condizioni meteorologiche predisponenti o ai primissimi sintomi; consigliato un trattamento cautelativo in pre-fioritura. 	<ul style="list-style-type: none"> fludioxonil + cyprodinil (3) clozolinate (4) pirimetanil (4) fenexamid mepanipyrim (4) 	<p>Al massimo 3 trattamenti annui per il controllo di questa avversità.</p> <p>(3) Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(4) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dall'avversità.</p>
Vaiolatura (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> raccogliere e distruggere le piante infette; impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente; adottare l'irrigazione per manichetta. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla presenza dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici diclofluanide (5) ditanon WG (granuli idrodispersibili) 	<p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dalla avversità.</p>

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Antracosi (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa vigente; • eliminare le piante infette; • impiegare varietà poco suscettibili. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in autunno e primavera, in presenza di condizioni predisponenti. 		(6) Al massimo 2 trattamenti annui, non usando dosi maggiori di 80 g/ha, per problemi di fitotossicità.
FITOFAGI	<p>Campionamento: su 100 foglie per ogni 500 mq.</p> <p>Biologico</p> <ul style="list-style-type: none"> • al superamento delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> – in pre-fioritura 10-15% di piante infestate; – in fioritura 25-30% di piante infestate; <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento va effettuato solo in caso di insuccesso della lotta biologica ed al superamento delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> – 20-30% di foglie infestate; – per l' <i>Aphis gossypii</i>, dalla pre-fioritura 50% di piante infestate 	<p>(7) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dal fitofago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crisopa, Sifridi, Coccinellidi • <i>Aphidoletes aphidimyza</i> (18 larve/mq), <i>Aphidius colemani</i> (4-8 ind/mq) o <i>Harmonia axyridis</i> (20-30 larve per focolaio); tenere presente le esigenze termiche degli ausiliari. • piretro naturale • pirimicarb (7) • <i>Beauveria bassiana</i> 	anno

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> installare trappole cromotropiche. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di forti infestazioni; in caso di forti infestazioni, alla comparsa delle prime forme giovanili; 	<ul style="list-style-type: none"> piretro naturale fosalone (8) <i>Beauveria bassiana</i> 	(8) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla ripresa vegetativa in caso di alte temperature effettuare una bagnatura fogliare; effettuare la sfogliatura e l'allontanamento dei residui. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla presenza dei primi individui eseguire dei lanci del predatore <i>Phytoseiulus persimilis</i> (5-6 ind/lancio/mq), eventualmente concentrare la distribuzione sui focolai d'infestazione. <p>Campionamento: su 100 foglie (metà giovani e metà senescenti) per ogni 500 mq.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> il trattamento va effettuato dopo la sfogliatura, solo in caso di insuccesso della lotta biologica ed al superamento della soglia del 30-40% di foglie con forme mobili. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Phytoseiulus persimilis</i> <p>(9) Effettuare, solo in caso di insufficiente presenza degli ausiliari, al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal principio attivo impiegato.</p>	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripide <i>(Frankliniella occidentalis)</i>	<p>Installare trappole cromotropiche azzurre.</p> <p>Agronomico</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare le erbe infestanti; • effettuare l'imbiancamento dei tunnel. <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dalla ripresa vegetativa, alle prime catture effettuare lanci di <i>Orius</i> spp. (0,5-3 ind/lancio/mq). <p>Campionamento: esaminare 1 fiore per 5m di fila binata.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo in caso di mancato successo del controllo biologico al superamento della soglia di 15-20 ind. mobili/fiore. 	<p>(10) Al massimo 1 trattamento annuo con piretroidi indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(11) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago.</p> <p>Antocoridi (<i>Orius</i> spp.)</p> <p><i>Amblyseius</i> spp.</p> <p>• Antocoridi (<i>Orius</i> spp.)</p> <p>• <i>Amblyseius</i> spp.</p> <p>• piretro naturale</p> <p>• acrinatrina (E-FLO) (10)</p> <p>• lufenuron (11)</p> <p>• <i>Beauveria bassiana</i></p>	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue fogliari (<i>Mamestra</i> spp.) Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">eliminare le erbe infestanti. Chimico: <ul style="list-style-type: none">in presenza di larve dopo il trapianto.	<ul style="list-style-type: none"><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>clorpirifos-metile (12)esche avvelenate a base di metiocarbazadiractina	(12) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Nematodi galligeni e fogliari (<i>Meloidogyne</i> spp., <i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Aphelenchoides</i> spp.)	Agronomico <ul style="list-style-type: none">adottare ampie rotazioni;preferire l'uso di materiale vivaistico sano e certificato.		
Limacce	Chimico <ul style="list-style-type: none">alla comparsa delle prime piante infestate.	<ul style="list-style-type: none">esche avvelenate a base di metaldeide o di metiocarb	

11 Difesa fitosanitaria integrata del kaki

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Cancro (<i>Phomopsis diospyri</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> eliminare i rami infetti con la potatura. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare 2-3 interventi nella fase di caduta foglie, solo negli impianti in cui la malattia è effettivamente presente. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici 	(1) Localizzati nel punto di impalcatura delle grosse branche, limitando il trattamento alle piante più infestate.
FITOFAGI Sesia (<i>Symanthedon tipuliformis</i>)	<p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> raschiare la corteccia nella zona dell'impalcatura delle branche sul tronco, dove avviene l'ovideposizione; ricoprire la zona scoperta con paste cicatrizzanti e disinfeettanti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in maggio-giugno ed agosto-settembre con almeno il 10-15% di piante infestate nella fase di sfarfallamento degli adulti. 	<ul style="list-style-type: none"> oli minerali (1) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca della frutta <i>(Ceratitis capitata)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare le consociazioni con altre specie fruttifere; • preferire l'impiego di coltivar a maturazione medio-precoce. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si consiglia di installare le trappole chemiotropiche ai primi di giugno e di intervenire alle prime catture; • nel caso in cui non vengano installate le trappole, controllare i frutti a partire dalla fase di pre-invasatura ed intervenire alle prime ovideposizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • malation (2) • etofenprox (3) 	(2) Al massimo 1 trattamento annuo. (3) Al massimo 2 trattamenti annui.

12 Difesa fitosanitaria integrata del melo

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE CRITTOGAMICHE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ticchiolatura (f.a. <i>Venturia inaequalis</i> ; f.c. <i>Spilocaea pomi</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> nella fase di "punte verdi", in alternativa ai prodotti rameici, si possono usare i polisolfuri, che hanno anche efficacia anticoccidica; gli interventi pre-fiorali, necessari in caso di andamento meteorologico piovoso, vanno effettuati con prodotti di copertura; utilizzare i fungicidi endoterapici dalla fioritura fino a "frutto noce", dopo ogni pioggia infettante e tenendo conto della persistenza del prodotto utilizzato; nella fase di ingrossamento frutti trattare solo se la malattia è presente in campo, utilizzando prodotti di copertura e sospendendo i trattamenti in piena estate se le temperature sono elevate; sulle foglie cadute effettuare un trattamento con urea agricola al 5% per favorirne la marcescenza. 	<ul style="list-style-type: none"> polisolfuro di bario o di calcio composti rameici mancozeb (1) metiram (1) ziram (1) tiram (1) ditanon dodina diclofluanide fenarimol (2) nuarimol (2) miclobutanil (2) bitertanol (2) esaconazolo (2) penconazolo (2) difenoconazolo (2) tetraconazolo (2) tebuconazolo (2) fenbuconazolo (2) pyrifenoxy (2) kresoxim-metile (3) pirimetanil (4) trifloxystrobin (3) cyprodinil (5) fluazinam 	<p>(1) I ditiocarbammati possono essere utilizzati al massimo fino a "frutto noce" (fine maggio).</p> <p>(2) Con gli IBE non effettuare più di 4 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità da controllare.</p> <p>(3) Ammessi non più di due trattamenti annui con le strobilurine indipendentemente dall'avversità da controllare.</p> <p>(4) Al massimo 3 interventi annui con le anilinopirimidine, indipendentemente dall'avversità da controllare.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità da controllare.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio (f.a. <i>Podosphaera leucotricha</i> ; f.c. <i>Oidium farinosum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in primavera eliminare i germogli colpiti; • con la potatura invernale asportare i rametti con gemme odiate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi a partire dalla pre-fioritura solo su cv particolarmente suscettibili (tipo Granny Smith) ed in condizioni altamente favorevoli allo sviluppo della fitopatia; negli altri casi attendere la comparsa della malattia, poiché, generalmente, i trattamenti antifitochiatura tengono sotto controllo anche questa avversità. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo • bupirimate • miclobutanol (6) • penconazolo (6) • tetraconazolo (6) • tebuconazolo (6) • fenarimol (6) • nuarimol (6) • pyrifenoxy (6) 	(6) Con gli IBE non effettuare più di 4 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità da controllare.
Cancri rameali (<i>Nectria galligena</i> , <i>Diaporthe perniciosa</i> , <i>Botryosphaeria obtusa</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asportare eventuali rami colpiti e bruciarli; • ripulire le superfici di taglio e trattarle con un mastice cicatrizzante, addizionato con sali di rame. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo negli impianti già colpiti o fortemente danneggiati da grandine, intervenire alla caduta del 30-40% delle foglie e poi alla loro completa caduta e, eventualmente, in primavera, all'ingrossamento delle gemme. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • ditianon • triadimefon (7) 	(7) Principio attivo da applicarsi esclusivamente mediante spennellatura, dopo l'asportazione del cancro, per proteggere la ferita, oppure sui grossi tagli di potatura o su gravi lesioni prodotte dalla grandine.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume del colletto <i>(Phytophthora cactorum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> adottare portainnesti tolleranti; evitare ferite al colletto; assicurare il drenaggio delle acque in eccesso. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in modo localizzato sulle piante colpite. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici fosetyl-alluminio metalaxil (8) 	(8) Al massimo 2 trattamenti annui con i derivati fenilamnidici, indipendentemente dall'avversità da controllare.
Malattie da conservazione <i>(Monilia spp., Penicillium expansum, Geosporium album, Botrytis cinerea, etc.)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> uno o due trattamenti in pre-raccolta, solo per le mele destinate ad una lunga frigo-conservazione. 	<ul style="list-style-type: none"> diclofluanide tebuconazolo (9) esaconazolo (9) penconazolo (9) 	(9) Con gli IBE al massimo 4 trattamenti annuali, indipendentemente dall'avversità da controllare.
Riscaldo comune delle mele	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> atmosfere controllate e basse temperature per la frutta destinata ad una prolungata conservazione. 		
Butteratura amara	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ogni 15 gg., a partire da giugno, solo su cv suscettibili (tipo Golden Delicious) o nei frutteti notoriamente affetti dall'alterazione. 	<ul style="list-style-type: none"> cloruro di calcio mediamente allo 0,6% 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia di San José (<i>Quadrastrius permiosus</i>)	<p>Campionamento: esaminare i tronchi e le branche di 10-20 piante/ha.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la soglia di intervento è pari alla presenza; • alla rottura delle gemme, trattamento valido anche contro la ticchiolatura ed i cancri rameali; • a maggio allo sgusciamento delle neanidi di 1 generazione, in assenza di parassitizzazione da parte di <i>Encarsia</i> e di <i>Aphytis</i>, solo nel caso non si sia intervenuti a fine inverno. 	<ul style="list-style-type: none"> • polisolfuro di calcio o di bario • oli minerali buprofezin • 1 trattamento annuo contro questo fitofago. 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • confusione sessuale (10). <p>Installare alla fase di mazzetti affioranti le trappole a feromoni, da controllare settimanalmente.</p> <p>Campionamento: alle prime catture verificare la percentuale di attacchi ai frutti, esaminando circa 500 frutti/ha.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la soglia di intervento è pari all'1-2% di frutti con iniziale infestazione larvale, se si usano gli organofosforici; • al superamento della soglia di 2-3 maschi/trappola/settimana, se si impiegano gli IGR o il <i>Cydia pomonella</i> granulosis virus. 	<ul style="list-style-type: none"> • dispenser 	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questo fitofago.</p> <p>(10) Applicabile nei meleti di almeno 2 ettari, dopo aver effettuato il trattamento contro la prima generazione.</p> <p>(11) Al massimo 3 trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(12) Al massimo 2 interventi annui, indipendentemente dal fitofago e comunque nell'ambito di tre trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dal fitofago e dal p.a.</p> <p>(13) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago, e comunque non più di tre trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dal fitofago e dal principio attivo.</p> <p>(14) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dall'avversità da effettuarsi esclusivamente in pre-raccolta.</p> <p>(15) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(16) Da impiegare preferibilmente sulle larve di 1 generazione.</p>

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi: Afide grigio (<i>Disaphis plantaginea</i>) Afide verde (<i>Aphis pomi</i>) Afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> introduzione a fine inverno di rami di potatura con colonie dell'Afide lanigero parassitizzate da <i>Aphelinus mali</i>. <p>Campionamento: esaminare germogli e mazzetti fiorali per un totale di 200 organi/ha.</p> <p>Chimico:</p> <p><u>Afide verde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire al superamento delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> – pre-fioritura: presenza; – ingrossamento frutti: 10-15% di germogli infestati; <p><u>Afide grigio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire al superamento delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> – pre-fioritura: presenza; – bottoni rosa: 5% degli organi infestati; – caduta petali: 1% rosette o germogli infestati; – frutto noce: 5% dei germogli infestati o 1-2 dei frutti infestati; <p><u>Afide lanigero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire al superamento delle seguenti soglie: <ul style="list-style-type: none"> – pre-fioritura: presenza; – bottoni rosa: 10% degli organi infestati; – post-fioritura 10-15% dei germogli infestati. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aphelinus mali</i> <ul style="list-style-type: none"> • pirimicarb • vamidotion (17) • imidacloprid (18) • azadiractina <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questi fitofagi</p> <p>(17) Solo se prevale la presenza di Afide lanigero ed al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(18) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Filominatori: Cemiostoma <i>(Leucoptera malifoliella)</i> Litocollete <i>(Phyllonorycter blancardella)</i>	<p>Installare le trappole a feromoni se si prevede di impiegare gli IGR.</p> <p>Campionamento: controllare la pagina inferiore di circa 300 foglie/ha prelevate a caso su circa il 5-10% delle piante.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il Cemiostoma la soglia è pari al 50% di foglie con uova o mine iniziali ed al 30% di foglie con mine più grandi; • per il Litocollete la soglia sale al 75% di foglie con uova o mine iniziali ed al 50% di quelle con mine di maggior diametro; • intervenire con gli IGR entro 3-4 giorni dall'inizio dei voli di I e II generazione, nei meleti soggetti a forti attacchi negli anni precedenti o con numerose crisalidi svernanti; non trattare mai la III e IV generazione, perché limitate da numerosi antagonisti naturali. 		<p>(19) Al massimo 3 trattamenti annui con esteri fosforici, a prescindere dal fitofago e dal p.a.</p> <p>(20) Al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dal fitofago, da effettuarsi entro fine maggio. Autorizzato solo su Cemiostoma.</p> <p>(21) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dal fitofago.</p>

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tortricidi ricamatori <i>(Pandemis cerasana;</i> <i>Archips podana;</i> <i>A. rosana,</i> <i>Adoxophyes orana)</i>	<p>Installare le trappole a feromoni entro l'ultima decade di marzo se si intende impiegare gli IGR o il <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>.</p> <p>Campionamento: esaminare gemme, germogli e mazzetti fiorali per un totale di 200 organi/ha.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i trattamenti contro la <i>Carpocapsa</i> sono efficaci anche contro le generazioni estive di questi fitofagi; Soglia d'intervento 5-7% organi infestati/pianta; • se si impiegano gli IGR o il <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> la soglia d'intervento, valutata sul numero di individui catturati in 1 o 2 settimane, è pari a 15 adulti per trappola se si conteggia esclusivamente il <i>Pandemis cerasana</i> o 30 adulti per trappola se si conteggiano tutte le specie. 	<ul style="list-style-type: none"> • clorpirifos-metile (22) • lufenuron (23) • tebufenozide • esaflumuron • triflumuron • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> • indoxacarb 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (22) Al massimo 2 interventi annui, indipendentemente dal fitofago e nell'ambito dei 3 trattamenti annui previsti con esteri fosforici, a prescindere dal fitofago e dal p.a. (23) Al massimo 2 interventi annui con questo p.a., indipendentemente dal fitofago.</p>
Rodilegno gallo <i>(Zeuzera pyrina)</i>	<p>Biotecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cattura massale <p>Installare le trappole sessuali ad inizio maggio.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattare dopo 3 settimane dall'inizio del volo. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 masstrap/ha 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rodilengo rosso <i>(Cossus cossus)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cattura massale. <p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei meleti di piccole dimensioni e nel caso di infestazioni circoscritte a poche piante, ricorrere all'uncinatura delle larve con fil di ferro. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 masstrap/ha 	
Mosca mediterranea della frutta <i>(Ceratitis capitata)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alle prime punture fertili. 	<ul style="list-style-type: none"> • fosalone (24) 	(24) Al massimo 1 trattamento annuo a prescindere dal fitofago.

13 Difesa fitosanitaria integrata del nespolo

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Tiechiolatura (<i>Fusicladium eriobotryae</i>)	Agronomico: • favorire l'arrieggiamento della chioma; • asportare e distruggere con la potatura gli organi infetti. Chimico: • intervenire nella fase di allegazione-caduta petali in caso di andamento climatico predisponente.		• composti rameici • dodina

14 Difesa fitosanitaria integrata del nocciolo

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI Necrosi batterica (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>corylina</i>) Cancro batterico (<i>Xanthomonas syringae</i> pv. <i>avellanae</i>)	Agronomico: • eliminare gli organi infetti con le operazioni di potatura; Chimico: • nel caso di accertata presenza e di andamenti meteorologici molto piovosi. Il primo intervento ricade nel periodo compreso tra fine estate-inizio autunno, i successivi vanno cadenzati in funzione dell'andamento meteorologico.		
CRITTOGAMAE Mal dello stacco (<i>Cytospora corylicola</i>)	Agronomico: • sostituire i vecchi impianti debilitati; • preferire l'allevamento monocauale; • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • effettuare un'idonea sistemazione del terreno; • eliminare le parti infette. Chimico: • in caso di infezioni molto gravi intervenire alla fine dell'estate ed alla ripresa vegetativa.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi radicali <i>(Armillaria mellea, Rossellinia necatrix)</i>	Agronomico: • effettuare un'idonea sistemazione del terreno; • realizzare concimazioni azotate ed organiche limitate; • rimuovere tutte le piante e tutte le radici infette dal patogeno.		
FITOFAGI Acaro delle gemme <i>(Phytoptus avellanae)</i>	Agronomico: • scegliere cultivar meno suscettibili (es. Mortarella). Campionamento: vanno esaminati alla ripresa vegetativa 4 rami/pianta sul 10% delle piante presenti in un ettaro, conteggiando il numero di gemme infestate sul totale delle gemme presenti. Chimico: soglia di intervento: 15-20% delle gemme infestate; • intervenire nel momento in cui si ha la migrazione dell'acaro dalle gemme infestate verso quelle sane; quando i nuovi germogli hanno 3-4 foglie completamente svolte.	Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago.	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Balanino <i>(Curculio nucum)</i>	Campionamento: da maggio a giugno scuotere le piante al mattino, affinché gli adulti cadano su un telone posto preventivamente al di sotto della chioma. Tale operazione viene fatta sul 10% delle piante presenti nel nocciolo. Chimico: soglia di intervento: 2-3- adulti per pianta	<ul style="list-style-type: none"> (1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi annui a prescindere dal fitofago. <ul style="list-style-type: none"> • endosulfan EC (1) • diazinone (1) • fenitrotion (2) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Apidia (<i>Haplidia etrusca</i>)	Agronomico: • seminare erbai autunno-vernni per indurre le larve ad alimentarsi di altre piante.		(3) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità ed esclusivamente a seguito di autorizzazione del Servizio per la Protezione delle Piante (4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago. (5) Al massimo 2 interventi annui a prescindere dal fitofago. (6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Anomala (<i>Anomala junii</i>)	Campionamento: alla ripresa vegetativa, sul 5% delle piante, effettuare sondaggi nella rizosfera.		
Maggiolino (<i>Melolontha</i> spp.)	Chimico: soglia di intervento: due larve per pianta; • nei noccioli in cui è stato riscontrato il superamento della soglia di intervento trattare tra la fase di post-allegagione ed ingrossamento dei frutti.	• endosulfan (3) • diazinone (4) • fenitrotion (5) • lambda-cialotrina (6)	
Cimici nocciolaie (<i>Gonocerus acuteangulatus</i> , <i>Nezara viridula</i> e <i>Palomena prasina</i>)	Agronomico: • evitare le consociazioni e la vicinanza di zone incolte in prossimità del nocciolo.		(7) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago. (8) Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dal fitofago.
	Campionamento si effettua come descritto per il Balanino.		
	Chimico: In genere i trattamenti contro l'Apidia e l'Anomala controllano anche questi fitofagi. soglia di intervento: 5-6 forme mobili per pianta.	• diazinone (7) • malation (7) • etofenprox (8)	
Aridi: Afide piccolo cremeo (<i>Myzocallis coryli</i>)	Campionamento: esaminare in primavera sul 10% delle piante presenti in un ettaro 8 germogli per pianta.		Al massimo 1 trattamento annuo contro questi fitofagi.
Afidone verde (<i>Corylobium avellanae</i>)	Chimico: soglia di intervento: 20-30% dei germogli infestati.	• piretro naturale • oli minerali	

15 Difesa fitosanitaria integrata del noce

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI Batteriosi	 Macchie nere del noce (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>juglandis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preferire le cv Nigra e Californica; • eliminare le parti infette; • disinfezare gli attrezzi usati nelle operazioni di taglio; • gli arboreti da legno sono tolleranti, il noce nero può considerarsi resistente. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • alla presenza dei sintomi a caduta foglie e ad apertura delle gemme sulle piante giovani, mentre su quelle adulte solo all'apertura delle gemme. 	
CRITTOGAMAE	 Antracnosi o "Fersa" (<i>Gnomonia juglandis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ raccogliere e distruggere le foglie infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti preventivi in corrispondenza di andamento meteorologico a rischio (in genere in primavera); • trattamento terapeutico alla ripresa vegetativa, alla comparsa delle prime macchie. 	
Marciumi radicali (<i>Armillaria mellea</i>)		<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ realizzare idonee sistemazioni del terreno • limitare l'uso della concimazione organica ed azotata laddove si pratica. 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Carie Carie bianca (<i>Stereum hirsutum</i> <i>Phomes igrarius</i>) Carie Bruna (<i>Polyporus sulphureus</i> <i>Fistulina hepatica</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• effettuare interventi di dendrochirurgia al riposo vegetativo (operazioni di slupatura dirette ad eliminare dai tronchi e dalle grosse branche le parti di legno alterate);• disinfezare le superfici di taglio e ricoprirle con mastic protettivi al fine di evitare la penetrazione di agenti patogeni da ferita.		
FITOFAGI Cidia (<i>Cydia pomonella</i>)	Installare trappole a feromoni in fase di post-allegagione per il monitoraggio della popolazione. Chimico: soglia di intervento: 2-5 maschi/trappola/settimana. <ul style="list-style-type: none">• fentoato• fenitrotion• <i>Cydia pomonella</i> granulosis virus (1)		Al massimo 2 interventi annui per il controllo di questo fitofago. (1) Da impiegare preferibilmente su larve di prima generazione.
Afidi Afide minore del noce (<i>Chromaphis juglandicola</i>) Afide maggiore del noce (<i>Callaphis juglandis</i>)	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• intervenire solo in caso di forti infestazioni. <input type="checkbox"/> oli minerali		

16 Difesa fitosanitaria integrata dell'olivo

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI Rognà (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>savastanoi</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di condizioni ambientali molto umide, dopo grandinate o dopo la pioggia nelle zone dove la patologia è molto presente. 	<p>composti rameici</p> <ul style="list-style-type: none"> composti rameici 	(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.
CRITTOGAMAE Occhio di pavone (<i>Spilocaea oleagina</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare varietà poco suscettibili (Frantoio, Ittana, Moraiolo); adottare sesti d'impianto non troppo fitti; favore l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma; effettuare concimazioni equilibrate. <p>Chimico:</p> <p>Effettuare interventi dopo aver diagnosticato la presenza del parassita col metodo della <u>diagnosi precoce</u>: raccogliere a caso da 10 piante distanti tra loro, per ogni ha di oliveto, 200 foglie e immergerle in una soluzione di NaOH 0 di KOH al 5% per 2-3 minuti, ad una temperatura, per le foglie vecchie, di 50-60° C, di 20-30°C per quelle giovani. Quindi, esaminate le foglie; su quelle infette si evidenzieranno macchie scure rotondeggianti. Questa diagnosi va effettuata al risveglio vegetativo ed a inizio autunno con frequenza quindicinale.</p> <ul style="list-style-type: none"> composti rameici dodina (1) <p>• soglia di intervento: 30-40% di foglie infette.</p>		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Lebra <i>(Colletotrichum gleosporioides)</i> Piombatura o Cercosporiosi <i>(Mycocentrospora cladosporioides)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arieggiare le chiome con operazioni di potatura laddove si sono verificati cospicui attacchi negli anni precedenti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • negli areali in cui nelle annate precedenti si è registrata la presenza dei patogeni, in corrispondenza delle prime piogge autunnali 		<p>(2) Di norma per il controllo di queste due criticogame risultano sufficienti gli stessi interventi consigliati contro l'Occhio di pavone, quando contro di esso si agisce con una certa regolarità.</p>
FITOFAGI	<p>Mosca delle olive <i>(Bactrocera oleae)</i></p> <p>Campionamento: Valutare settimanalmente dalla fase di ingrossamento frutti la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 frutti a caso su 10 piante).</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia di intervento: 1-3% di infestazione attiva per le olive da tavola, del 10-15% per quelle da olio. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici (2) 	<p>Per il controllo del fitofago sono ammessi nel complesso 2 interventi fitostratificati al massimo all'anno.</p> <p>(3) Se ne sconsiglia l'impiego su cv Frantoi, Coratina ed Itrana per fitotossicità, con tale p.a. vanno effettuati al massimo 2 trattamenti annui, alla dose massima di 40 g/ha.</p> <p>(4) Al massimo un trattamento annuo a prescindere dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tignola <i>(Perips oleae)</i>	<p>Campionamento: esaminare 100 infiorescenze, su 5-10 piante a caso. La percentuale di infestazione ottenuta, divisa per 3, consente di ottenere la stima del danno che verrà poi arrecaato alle drupe dalla generazione carpofaga.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia di intervento: oltre il 30-35% di fiori infestati. Tale soglia corrisponde approssimativamente al 10-15% di frutti infestati dalla generazione carpofaga. Per le olive da tavola la soglia d'intervento va ridotta alla metà. 		<p>In caso di superamento della soglia di intervento, trattare solo la generazione carpofaga, ed effettuare al massimo 1 trattamento annuo a prescindere dal principio attivo impiegato.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia mezzo grano di pepe <i>(Saissetia oleae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitare le concimazioni azotate; • favorire l'insolazione all'interno della chioma con la potatura. <p>Campionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nella fase del riposo invernale prelevare a caso 100 foglie, dalla parte bassa della chioma, su 5-10 piante per ogni 100 della coltivazione; – nella fase di sforitura-allegagione valutare la percentuale di femmine mature che hanno concluso l'ovideposizione, raccolte su 10 rami presi dal 5-10% delle piante. <p>Chimico: soglia di intervento: 5-10 neanidi vive per foglia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • oli minerali <p>In genere non è consigliabile intervenire nella fase di riposo invernale, tranne in zone costiere e calde a causa dell'insoddisfacente efficacia dei mezzi chimici. Il momento migliore per il trattamento si ha nella fase di sforitura-allegagione quando il 90-95% di femmine ha ovideposto e le uova sono schiuse.</p>	

17 Difesa fitosanitaria integrata del pero

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Ticchiolatura (f.a. <i>Venturia pyrina</i> ; f.c. <i>Spilocaea pyri</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla rottura delle gemme, in alternativa ai prodotti rameici, si possono usare i polisolfuri, che hanno anche efficacia anticoccidica; gli interventi pre-florali, necessari in caso di andamento meteorologico piovoso, vanno effettuati con prodotti di copertura; utilizzare i fungicidi endoterapici dalla fioritura fino a “frutto noce”, dopo ogni pioggia infettante e tenendo conto della persistenza del prodotto utilizzato; nella fase di ingrossamento frutti, trattare solo se la malattia è presente in campo, utilizzando prodotti di copertura e sospendendo i trattamenti in piena estate, se le temperature sono elevate. a fine caduta foglie, effettuare un trattamento sulle foglie cadute al suolo con urea agricola al 5%, per favorire la marcescenza. 	<ul style="list-style-type: none"> polisolfuro di bario o di calcio composti rameici mancozeb (1) metiram (1) ziram (1) tiram (1) ditianon dodina diclofluanide fenarimol (2) nuarimol (2) miclobutanil (2) biterianolo (2) esaconazolo (2) penconazolo (2) fenbuconazolo(2) difenoconazolo(2) tetraconazolo (2) tebuconazolo (2) pyrifenoX (2) kresoxim-metile (3) pirimetanil (4) trifloxystrobin (3) cyprodinil (5) 	<p>(1) I ditiocarbammati possono essere utilizzati massimo fino a "frutto noce" (fine maggio) e per non più di 3 volte, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Con gli IBE sono ammessi al massimo 3 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Ammessi non più di due trattamenti annui con le strobilurine indipendentemente dall'avversità da controllare.</p> <p>(4) Al massimo 3 trattamenti annui con le anilinopirimidine, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitare le irrigazioni evitando quelle soprachioma; • raccogliere e distruggere i frutti colpiti; • limitare le concimazioni azotate; □ non effettuare potature troppo energiche; • prevenire eventuali clorosi ferriche. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei pereti ancora indenni effettuare rilievi settimanali, intervenendo alla comparsa delle prime macchie; • nei pereti colpiti l'anno precedente intervenire a partire da "frutto noce" fino a maturazione, in concomitanza di piogge persistenti. 	<p>(6) Al massimo 1 trattamento annuo con i derivati dicarbossimidici, indipendentemente dall'avversità. Iprodione fitotossico su "Decana del comizio".</p> <p>(7) Al massimo 3 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(8) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p>	
Cancri e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i> , <i>Diaporthe perniciosa</i> , <i>Botryosphaeria obtusa</i>)	<p>Agronomico</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante la potatura asportare e bruciare i rami colpiti. <p>Chimico</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima della defogliazione e ad ingrossamento gemme; nei frutteti giovani o in quelli gravemente infetti anche a metà caduta foglie; • i trattamenti con i composti rameici sono validi anche contro la necrosi batterica delle gemme e dei fiori. 		<p>(9) Da applicarsi, mediante spennellatura, dopo la asportazione del cancro per la protezione della ferita, sui grossi tagli di potatura o sulle lesioni prodotte dalla grandine.</p>
Marciume del colletto (<i>Phytophthora cactorum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare ferite al colletto. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in modo localizzato sulle piante colpite. 		<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • fosetyl-alluminio

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Septoriosi (f.a. <i>Mycosphaerella pyri</i> ; f.c. <i>Septoria pyricola</i>)	Agronomico • distruggere le foglie colpite ai primi sintomi. Chimico: • ai primi sintomi; • in autunno sulle foglie cadute effettuare un trattamento con urea agricola al 5%, per favorire la marcescenza.	• diclofluanide • dodina • tebuconazolo (10)	(10) Con i derivati degli IBE al massimo 3 trattamenti annui a prescindere dall'avversità.
FITOFAGI Psilla del pero (<i>Cacopsylla pyri</i>)	Agronomico: • non eccedere nelle concimazioni azotate. Campionamento: esaminare complessivamente 100 germogli su 10-20 piante ad ettaro. Chimico: • in presenza di melata • soglia d'intervento: 15-20% dei germogli con uova e/o neanidi Alla presenza di 1 Antocorde (<i>Anthocoris nemoralis</i>) ogni 5 germogli campionati autorizzati esclusivamente interventi con dilavanti.	• lavaggi con diottolsolfosuccinato di sodio o con soluzioni di urea • amitraz (11) • diflubenzuron • teflubenzuron • triflumuron • esaflumuron	Al massimo 2 interventi annuali contro questo fitofago. (11) Al massimo 1 trattamento annuo in caso di sovrapposizione di diversi stadi biologici.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tentredine <i>(Hoplocampa brevis)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> nelle zone infestate preferire varietà a fioritura precoce. <p>Campionamento: esaminare complessivamente 100 fiori o bottoni fiorali su 10-20 piante ad ettaro.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> se si intende utilizzare la soglia relativa alle catture, installare le trappole cromotropiche bianche entro inizio marzo; Soglie d'intervento: <ul style="list-style-type: none"> – 20 adulti/trappola/settimana; – 15% di mazzetti con uova, dopo aver sfalcato l'essenze erbacee per evitare danni ai prunuli. <p>Trattamento valido anche per gli afidi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> acefate (12) fosalone (13) imidacloprid (14) 	<p>Al massimo 1 trattamento annuo contro la Tentredine.</p> <p>(12) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(13) Al massimo 2 trattamenti annui con questo principio attivo, a prescindere dal fitofago.</p> <p>(14) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago, intervenendo ad "orecchiette di topo", a prescindere dalla soglia d'intervento, esclusivamente nei pereti nei quali l'anno precedente è stata superata la soglia d'intervento.</p>
Cocciniglia di San Josè <i>(Quadrapsidiotus permiosus)</i>	<p>Campionamento: esaminare i tronchi e le branche di 10-20 piante/ha.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la soglia di intervento è pari alla presenza; alla rotura delle gemme, trattamento valido anche contro la ticchiolatura ed i cancri rameali; a maggio allo sgusciamento delle neanidi di 1 generazione, in assenza di parassitizzazione da parte di <i>Encarsia</i> e di <i>Apyitis</i>, solo nel caso non si sia intervenuti a fine inverno. 	<ul style="list-style-type: none"> polisolfuro di calcio o di bario oli minerali buprofezin 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragno rosso dei fruttiferi <i>(Panonychus ulmi)</i>	<p>Campionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante il riposo vegetativo esaminare da 5 a 10 pezzi di legno di due anni per una lunghezza totale di 1-2 m.; l'entità delle ovideposizioni fornisce una stima dell'attacco prevedibile in primavera-estate; • in pre-fioritura da orecchiette di topo e nelle successive fasi fenologiche esaminare 100 foglie (2-5 foglie per 20-50 piante). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia d'intervento nella fase di gemme gonfie: numero di uova superiore a 30 per ostacolo (gemma, rilievo della corteccia, ecc.); • soglia d'intervento dalla fase di orecchiette di topo: 60% di foglie occupate da forme mobili e con meno del 20% di foglie con acari predatori (Fitoseidi) o meno di uno <i>Stethorus</i> ogni 2-3 foglie. 		Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Carpocapsa <i>(Cydia pomonella)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • confusione sessuale (15). <p>Installare alla fase di mazzetti affioranti le trappole a feromoni, da controllare settimanalmente.</p> <p>Campionamento: alle prime catture verificare la percentuale di attacchi ai frutti, esaminando circa 500 frutti/ha.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la soglia di intervento è pari all'1-2% di frutti con iniziale infestazione larvale, se si usano gli organofosforici; • al superamento della soglia di 2-3 maschi/trappola/settimana, se si impiegano gli IGR o il <i>Cydia pomonella</i> granulosis virus. 	<ul style="list-style-type: none"> • dispenser <p>(15) Applicabile nei pereti di almeno 2 ettari, dopo aver effettuato il trattamento contro la prima generazione.</p> <p>(16) Al massimo 2 interventi annui, indipendentemente dal fitofago e comunque nell'ambito di tre trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dal fitofago e dal p.a.</p> <p>(17) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago, e comunque non più di tre trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dal fitofago e dal principio attivo.</p> <p>(18) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(19) Da impiegare preferibilmente sulle larve di 1 generazione.</p>	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questo fitofago.</p> <p>(15) Applicabile nei pereti di almeno 2 ettari, dopo aver effettuato il trattamento contro la prima generazione.</p> <p>(16) Al massimo 2 interventi annui, indipendentemente dal fitofago e comunque nell'ambito di tre trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dal fitofago e dal p.a.</p> <p>(17) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago, e comunque non più di tre trattamenti annui con esteri fosforici indipendentemente dal fitofago e dal principio attivo.</p> <p>(18) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(19) Da impiegare preferibilmente sulle larve di 1 generazione.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tortricidi ricamatori <i>(Pandemis cerasana, Archips podanus, A. rosanaus)</i>	<ul style="list-style-type: none"> installare le trappole a feromoni, entro l'ultima decade di marzo, se si intende impiegare gli IGR o il <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>. <p>Campionamento: esaminare gemme, germogli e mazzetti fiorali per un totale di 200 organi/ettaro.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> i trattamenti contro la Carpocapsa sono efficaci anche contro le generazioni estive di questi fitofagi; soglia di intervento: 5% di germogli infestati se si impiegano gli organofosforici; se si impiegano gli IGR o il <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> la soglia d'intervento, valutata sul numero di individui catturati in 1 o 2 settimane, è pari a 15 adulti per trappola se si conteggia esclusivamente il <i>Pandemis cerasana</i> o 30 adulti per trappola se si conteggiano tutte le specie. 	<ul style="list-style-type: none"> flufenoxuron (20) clorpirifos-metile (21) lufenuron (21) tebufenozide esaflumuron triflumuron <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> indoxacarb 	<p>(20) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago, da effettuare entro fine maggio.</p> <p>(21) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dal fitofago, con ciascuno di questi p.a.</p>
Afidi Afide sanguigno del pero <i>(Dysaphis pyri)</i> Fillossera del pero <i>(Aphanoostigma pyri)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> limitare le concimazioni azotate. <p>Campionamento: a partire dal germogliamento esaminare 100 organi (mazzetti fiorali e germogli)/ha.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire al superamento della soglia di intervento del 5% di getti infestati 	<ul style="list-style-type: none"> pirimicarb imidacloprid (22) 	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questi fitofagi.</p> <p>(22) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago, intervenendo ad "orecchiette di topo", a prescindere dalla soglia, nelle zone notoriamente infestate da afidi.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rodilegno giallo <i>(Zeuzera pyrina)</i>	<p>Biotecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cattura massale <p>Installare le trappole sessuali ad inizio maggio.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattare dopo 3 settimane dall'inizio del volo. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 masstrap/ha 	
Rodilegno rosso <i>(Cossus cossus)</i>	<p>Biotecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cattura massale <p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei pereti di piccole dimensioni e per infestazioni circoscritte a poche piante uncinatura delle larve con fil di ferro 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 masstrap/ha 	

18 Difesa fitosanitaria integrata del pesco

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Cancro batterico (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • evitare le cv più sensibili. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo in caso di accertata presenza della malattia, trattamenti a distanza di 8-10 giorni nella fase di caduta foglie. 		
Tumore radicale (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. 		
CRITTOGAMAE Bolla o Accartocciamento fogliare (<i>Taphrina deformans</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei peschetti con un basso livello di rischio di infezione, un primo trattamento alla caduta di almeno l'80% delle foglie ed un secondo a fine inverno o posticipato nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa; • negli impianti colpiti l'anno precedente in forma grave o in caso di andamenti freddi e piovosi effettuare un primo trattamento alla caduta di almeno l'80% delle foglie, un secondo verso fine inverno ed un terzo nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa. 	(1) Al massimo indipendentemente dall'avversità con uno di questi p.a., sconsigliato su cv sensibili (tipo Red Haven) prima della completa caduta foglie.	trattamento annuo

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Corineo o Impallinatura <i>(Clasterosporium carpophilum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitare le concimazioni azotate e le irrigazioni; • asportare e bruciare i rami colpiti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi eseguiti per la Bolla sono generalmente molto efficaci anche per il controllo del Corineo. 		<p>(2) Al massimo 3 trattamenti annui per le varietà a maturazione precoce e 4 per quelle a maturazione tardiva, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Sono da evitare su piante con rametti non ben significati.</p>
Cancro dei rametti <i>(Fusicoccum amygdali)</i> Secume rameale <i>(Cytospora cincta, C. leucostoma)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asportare e bruciare i rami colpiti; • effettuare concimazioni azotate equilibrate; • preferire le irrigazioni sotto chioma; • disinsettare i grossi tagli di potatura; • proteggere adeguatamente i punti di innesto; • sistemare accuratamente il terreno; • scegliere varietà poco suscettibili. <p>Chimico:</p> <p>Intervenire solo in caso di accertata presenza delle malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di bottoni rosa o scamiciatura; • intervenire ad inizio-metà caduta foglie, in concomitanza di periodi umidi e piovosi. 	<ul style="list-style-type: none"> • bitertanolo (2) • ditianon • composti rameici (3) 	

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio o Mal bianco (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere varietà poco suscettibili nelle aree ad alto rischio; • effettuare concimazioni equilibrate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le varietà poco suscettibili e nelle zone a basso rischio è sufficiente un solo trattamento preventivo alla sciamiciatura, mentre nelle aree ad alto rischio (es. collina) e sulle cv più recettive intervenire preventivamente a fine fioritura e dopo 8-10 gg.; ripetere il trattamento alla comparsa dei sintomi. • zolfo <ul style="list-style-type: none"> • bupirimate • bitertanol (4) • esaconazolo (4) • penconazolo (4) • tetriconazolo (4) • fenarimol (4) • nuarimol (4) • triadimenol (4) • miclobutani (4) • propiconazolo (4) • tebuconazolo (5) • pyrifenoxy (4) • fenbuconazolo (4) 		<p>(4) Al massimo 3 trattamenti annui per le varietà a maturazione precoce e 4 per quelle a maturazione tardiva, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Moniliosi <i>(Monilia laxa - Monilia fructigena)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere appropriati sesti d'impianto; • evitare un eccessivo rigoglio vegetativo; • eseguire un'accurata potatura verde; • asportare e bruciare le mummie ed i rami infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in periodo pre-fiorale solo su cv molto suscettibili al verificarsi di condizioni meteorologiche predisponenti (elevati valori di umidità); • intervenire in pre-raccolta, al verificarsi di condizioni meteorologiche predisponenti, su cv molto suscettibili a raccolta medio-tardiva ed in generale sulle varietà destinate alla conservazione per medio-lungo periodo. 	<ul style="list-style-type: none"> • bitertanolo (6) • esaconazolo (6) • fenbuconazolo (6) • tebuconazolo (9) • iprodione (7) (8) • procimidone (7) • clozolinate (7) • fludioxonil + cyprodinil (9) • fenexamid • 	<p>Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(6) Al massimo 3 trattamenti annui per le varietà a maturazione precoce e 4 per quelle a maturazione tardiva, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(7) Ammesso fino alla scanciatura. Con i dicarbossimidici al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(8) Ammesso anche in pre-raccolta, solo su cv a maturazione tardiva, ponendo la massima attenzione al tempo di carenza.</p> <p>(9) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Marciume radicale <i>(Armillariella mellea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare un accurato sgrondo delle acque dal suolo ed evitare per quanto possibile ferite all'apparato radicale. 		
Malattie del post-raccolta	<p>Fisico:</p> <p>Se si verificano condizioni predisponenti all'infezione nei 7 gg. precedenti la prima raccolta ricorrere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preraffigerazione; • atmosfera controllata; • trasporto refrigerato con atmosfera arricchita di anidride carbonica. 		

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume nero <i>(Rhizopus nigricans)</i> Marciume verde-azzurro <i>(Penicillium expansum)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> evitare ferite, abrasioni e bagnature dei frutti; ricorrere alla prerefrigerazione rapida del prodotto; limitare la conservazione; non conservare il prodotto che ha subito piogge prolungate o grandine nella fase finale della maturazione; "catena del freddo" ininterrotta. 		
FITOFAGI	<p>Afidi:</p> <p>Afide verde <i>(Myzus persicae)</i></p> <p>Afide sigario <i>(Myzus varians)</i></p> <p>Afide bruno <i>(Brachycaudus schwarzii)</i></p> <p>Afide nero <i>(Brachycaudus persicae)</i></p> <p>Afide farinoso <i>(Hyalopterus amygdali)</i></p> <p>Campionamenti: esaminare 100 germogli/ha prelevati a caso sul 5-10% delle piante.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a partire dalla fase di gemme rigonfie-bottoni rosa fino alla fase di ingrossamento dei frutti; soglia di intervento: 3% di germogli infestati per le nectarine; 7-10% per le pesche; soglia di intervento per l'Afide farinoso: 4% di germogli infestati su pesche e 2% su nectarine; le soglie d'intervento si innalzano al 25% per l'afide nero e per quello bruno nella fase di frutto noce-ingrossamento frutti. 	<ul style="list-style-type: none"> acefate (10) pirimicarb (11) imidacloprid (12) azadiractina pymetrozine (11) 	Solo per l'afide farinoso intervenire in maniera localizzata (10) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago, non oltre caduta petali. (11) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago. (12) I solo intervento a bottoni rosa e solo nelle zone dove ogni anno si hanno elevati livelli di infestazione.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi <i>(Taeniothrips meridionalis, Thrips major, Frankliniella occidentalis)</i>	Campionamenti: si esaminano 100 fiori scelti a caso sul 5-10% delle piante. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• soglia di intervento: 3% dei fiori con presenza di tripidi.	<ul style="list-style-type: none"> • acefate (13) • lufenuron (14) • acrinatrina (E-FLO) (15) • azadiractina 	<p>Per il controllo di tali fitofagi va effettuato 1 solo trattamento annuo; un ulteriore intervento è consentito solo su cv di nettarine o in zone nelle quali negli anni precedenti si sono verificate forti infestazioni; tale intervento può essere effettuato in fase di maturazione.</p> <p>(13) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago, non oltre caduta petali.</p> <p>(14) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(15) Al massimo 1 intervento annuo a prescindere dal fitofago ed esclusivamente su cv di nettarine extra-precoce e precoce, per le quali non sono stati effettuati interventi con esteri fosforici per il contenimento delle neanidi estive di cocciniglia.</p>

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cidia o Tignola orientale <i>(Cydia molesta)</i> Anarsia o Minatrice dei germogli <i>(Anarsia lineatella)</i>	<p>Installare le trappole a feromoni a fine fioritura nel caso si intendano utilizzare gli IGR.</p> <p>Campionamenti: su 100 germogli/ha e/o 100 frutti/ha scelti a caso sul 5-10% delle piante, dopo le prime catture degli adulti 0, in assenza di trappole, al verificarsi dei primi attacchi.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire con gli IGR quando si ha un sensibile incremento nelle catture degli adulti. <p>Se si impiegano i fosfororganici attenersi alle seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> soglia di intervento: 3% di infestazione attiva per l'Anarsia, calcolata applicando la seguente formula: soglia di Intervento = (% di germogli infestati/3 + % di frutti infestati)/2; per la Cidia la soglia di intervento è di 1-2% di germogli e/o frutti infestati 	<p>• triflumuron • teflubenzuron • esaflumuron • lufenuron (16)</p> <p>• <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> • fosalone (17) • diazinone (17) • triclorfon (17) • clorpirifos etile (17) • fenitroton (18) • etofenprox (19) • indoxacarb</p>	<p>(16) AI massimo 2 interventi annui indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(17) AI massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(18) Autorizzato esclusivamente per il controllo della Cidia. AI massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(19) AI massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago 1 trattamento per le varietà precoci e 2 per le tardive.</p>

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia bianca del pesco (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	<p>Campionamenti: vanno esaminati a fine agosto-settembre, in corrispondenza dell'ultima comparsa annuale di neanidi, i tronchi, le branche ed i rami di 100 piante/ha. Tale campionamento va effettuato anche nella fase di sfioritura-allegagione.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> introduzione di rami contenenti cocciniglie parassitizzate da <i>Encarsia berlesei</i>. <p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di infestazioni localizzate intervenire con spazzolature delle parti infestate. <p>Chimico:</p> <p>Soglie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-15% di piante infestate in fase di sfioritura-allegagione; 20-30% di piante infestate nel periodo di fine agosto-settembre. 	<p>(20) Al massimo 2 trattamenti indipendentemente dal fiorfago nella fase di migrazione delle neanidi di I generazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Encarsia berlesei</i> 	
Cocciniglia di San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	<p>Chimico:</p> <p>Soglia d'intervento: presenza; di norma sulle forme svernanti, che sono facilmente aggredibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> proseguire nelle osservazioni a partire dalla fase di frutticini in sviluppo ed intervenire in presenza delle prime infestazioni in modo che la cocciniglia non passi sui frutti. 	<ul style="list-style-type: none"> ● polisolfuro di bario ● oli minerali all'1-2% ● clorpirifos-metile (20) ● buprofezin ● clorpirifos-metile (20) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cicaline <i>(Asymmetrasca decedens, Zygina flammigera)</i>	<p>Campionamento: su 100 germogli/ha scelti a caso, dopo la comparsa dei primi adulti. La presenza degli adulti può essere monitorata facoltativamente mediante l'impiego di trappole cromotropiche.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di norma i trattamenti per il controllo di Cidia ed Anarsia sono efficaci anche contro questo fitofago; <p>Soglia d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10-20% dei germogli infestati sulle piante giovani; • 20-30% dei germogli infestati sulle piante in produzione. 	<p>(21) AI massimo 1 intervento indipendentemente dal fitofago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • fenitrotion (21) 	
Mosca mediterranea della frutta <i>(Ceratitis capitata)</i>	<p>Installare trappole cromotropiche gialle poco prima dell'invasiatura, esclusivamente per le varietà la cui raccolta inizia dopo la prima metà di luglio.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla cattura dei primi adulti; • intervenire alle prime catture e punture fertili. 	<p>(22) AI massimo 2 trattamenti indipendentemente dal fitofago. Porre attenzione alle varietà sensibili al dimetatoato.</p> <p>(23) AI massimo 1 trattamento alla chiona indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(24) AI massimo 1 trattamento annuo esclusivamente in pre-raccolta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • esche proteiche con dimetatoato (22) • triclorfon (23) • diazinone (23) • etofenprox (24) 	

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rignetto rosso dei fruttiferi <i>(Panonychus ulmi)</i>	<p>Campionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> in pre-fioritura e nelle successive fasi fenologiche esaminare 100 foglie (2-5 foglie per 20-50 piante). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> soglia d'intervento: 60% di foglie occupate da forme mobili e con meno del 20% di foglie con acari predatori (Fitoseidi). 	Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago. Si raccomanda l'impiego dello zolfo in polvere nei trattamenti antiodici per la sua azione acarofrenante. <ul style="list-style-type: none"> clofentezine exitiazox feniproximate tebufenpirad fenaquaquin 	
Nematodi galligeni <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare portinnesti resistenti acquistare piante certificate adottare opportune rotazioni 		

19 Difesa fitosanitaria integrata del susino

AVVURSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Cancro batterico delle drupacee <i>(Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; utilizzare cv poco suscettibili; eliminare e distruggere le parti colpite durante la potatura invernale. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> solo in caso di accertata presenza della malattia, trattamenti a distanza di 8-10 giorni nella fase di caduta foglie. 		
CRITTOGAMAE Corineo <i>(Clasterosporium carpophilum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> evitare i ristagni idrici; limitare le concimazioni azotate; asportare e bruciare i rami colpiti alla potatura invernale. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a caduta foglie solo in ambienti favorevoli e su cultivar suscettibili. 		<ul style="list-style-type: none"> composti rameici

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Moniliosi <i>(Monilia laxa e Monilia fructigena)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere sesti d'impianto appropriati; • eseguire un'accurata potatura verde; • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • asportare e bruciare le mummie ed i rami infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in periodo pre-fiorale, solo su cv molto suscettibili, al verificarsi di condizioni meteorologiche predisponenti (elevati valori di umidità); • intervenire in post-fioritura ed in caso di varietà sensibili e se le condizioni meteorologiche sono favorevoli allo sviluppo del patogeno anche in pre-raccolta, ponendo molta attenzione ai tempi di carenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • iprodione (1) • procimidone (1) • propiconazolo (2) • fludioxonil + cyprodinil (3) • fenexamid • tebuconazolo (3) 	<p>Di norma ammessi 2 interventi annui contro questa avversità, solo su cv molto suscettibili ammessi 3 interventi annui.</p> <p>(1) Ammesso fino alla scamicatura. (2) Al massimo 3 interventi annui con gli IBE, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Ruggine <i>(Tranzschelia pruni-spinosae)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire su varietà suscettibili alla comparsa delle prime pustole e se le condizioni meteorologiche permangono favorevoli all'infezione, ripetere il trattamento dopo 8-12 gg. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo 	<p>Solo per l'Afide farinoso intervenire in maniera localizzata.</p> <p>(4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago da eseguire non oltre la scamicatura.</p> <p>(5) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago a bottoni rosa ed in zone gravemente infestate.</p>
FITOFAGI			
Afidi: Afide verde <i>(Brachycaudus helichrysi)</i> Afide farinoso <i>(Hyalopterus pruni)</i>	<p>Campionamenti: esaminare 100 germogli/ha prelevati a caso sul 5-10% delle piante.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dalla fase di gemme rigonfie fino alla fase di ingrossamento dei frutti; • soglia di intervento: 3% di germogli infestati. 	<ul style="list-style-type: none"> • pirimicarb (4) • acefate (5) • imidacloprid (6) 	

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cocciniglia di S. José (<i>Quadrastidiotus perniciosus</i>)	Chimico: soglia d'intervento: presenza • di norma sulle forme svermanti, che sono facilmente aggredibili; • proseguire nelle osservazioni a partire dalla fase di frutticini in sviluppo ed intervenire in presenza delle prime infestazioni in modo che la cocciniglia non passi sui frutti.	• polisolfuro di bario (7) • oli minerali	(7) Efficace anche contro la Monilia.
Cidia delle susine (<i>Cydia funebrana</i>)	Chimico: soglia di intervento: 10 catture/trappola/settimana; Installare le trappole a feromone se si intende impiegare il <i>Bacillus thuringiensis</i> .	• <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	(8) Al massimo 1 trattamento annuo, (9) indipendentemente dal fitofago. Al massimo 1 trattamento annuo in pre raccolta, indipendentemente dal fitofago.
Tentredini (<i>Hoplocampa flava</i> , <i>H. minuta</i> , <i>H. rutilicornis</i>)	Chimico: soglia di intervento: in post-fioritura 50 catture/trappola.	Installare le trappole cromotropiche bianche in pre-fioritura, nei frutteti dove è nota la presenza del fitofago. Chimico: soglia di intervento: in post-fioritura 50 catture/trappola.	In genere controllate dai trattamenti contro gli afidi e la Cidia delle susine. (10) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago. • fenitrotion (10)

20 Difesa fitosanitaria integrata della vite per uva da vino

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE CRITOGAME	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora <i>(Plasmopara viticola)</i>	<p>Chimico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il primo trattamento due o tre giorni prima dello scadere del periodo di incubazione, calcolato sulla base della regola dei “tre dieci”, con prodotti di copertura o citotropici; • in alternativa alla predetta strategia, nelle zone a minore rischio, è preferibile attendere la comparsa della prima “macchia d’olio”, utilizzando, in tal caso, prodotti citotropici o sistemici; • in pre-fioritura ed a fine fioritura, effettuare comunque due trattamenti cauteletivi, anche se non è ancora comparsa la “macchia d’olio”, preferendo, soprattutto nelle zone più a rischio, prodotti sistemici; • dall’allegazione in poi i trattamenti vanno eseguiti solo se la malattia è presente in campo, o dopo piogge copiose ed in caso di prolungate rugiade mattutine, impiegando, preferenzialmente, miscele a base di prodotti di copertura e citotropici; • in agosto, per limitare le infezioni tardive e preventire le varie forme di marciume del grappolo, è opportuno eseguire un trattamento “di chiusura”, con formulati a base di rame. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • cimoxanil • fosetyl-alluminio • diclofluanide (1) • mancozeb (2) • metiram (2) • dimelomorf (3) • metalaxil (4) • benalaxil (4) • oxadixil (4) • azoxystrobin (5) • ditianon WG (granuli idrodispersibili) • famoxadone + cimoxanil • famoxadone + mancozeb • famoxadone + fosetyl-alluminio (6) • iprovalicarb (3) • metalaxil M+mancozeb (7) 	<p>(1) Impiegabile fino alla fase di allegagione.</p> <p>(2) I ditiocarbammati possono essere impiegati fino all’allegagione e non più di 3 volte, indipendentemente dall’avversità.</p> <p>(3) Al massimo 3 trattamenti annui,</p> <p>(4) Al massimo 3 trattamenti annui con i derivati fenilmnidici, indipendentemente dall’avversità.</p> <p>(5) Ammessi non più di tre trattamenti annui con le strobilurine ed il famoxadone, indipendentemente dall’avversità da controllare. Non associare antiodici a questo principio attivo, perché contiene efficacemente anche l’Oidio.</p> <p>(6) Ammessi non più di tre trattamenti annui con le strobilurine ed il famoxadone, indipendentemente dall’avversità da controllare.</p> <p>(7) Al massimo 3 trattamenti annui, indipendentemente dall’avversità in alternativa con i trattamenti con i ditiocarbammati.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ordio (fa. <i>Uncinula necator</i> ; f.c. <i>Oidium tuckernii</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare l'impianto del vigneto in zone con ristagno di umidità e ridotta luminosità; • impiantare il vigneto in zone ben ventilate; • evitare cloni troppo vigorosi; • limitare le concimazioni azotate; • eseguire la potatura verde; • effettuare la sfogliatura alla base dei tralci e nella zona dei grappoli. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iniziare i trattamenti a partire dalla fase di germogliamento, solo dopo aver accertato la presenza di infezioni, o se trattasi di coltivar molto suscettibili o di zone ad alto rischio, utilizzando prodotti di copertura; • negli altri casi attendere la pre-fioritura per effettuare il primo trattamento; • in pre-fioritura ed in post-fioritura, effettuare comunque due trattamenti cautelativi, preferibilmente con prodotti sistemicici; • fino all'inviaiatura trattare anche in assenza della malattia, adottando intervalli minori in corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini o nel caso di presenza di qualche focolaio di infezione; • in fase di pre-chiusura del grappolo è consigliabile un'applicazione di zolfo in polvere; • dall'inviaiatura in poi intervenire solo se vi è presenza in campo della fitopatia. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo (8) • dinocap (9) • quinoxifen (10) • esaconazolo (11) • penconazolo (11) • fenbuconazolo (11) • tebuconazolo (11) • tetriconazolo (11) • triadimenol (11) • miclobutanil (11) • fenarimol (11) • nuarimol (11) • pyrifenoxy (11) • azoxystrobin (12) • <i>Ampelomyces quisqualis</i> • kresoxim-metile (13) • trifloxystrobin (12) 	<p>(8) Limitare l'uso dello zolfo in prossimità della raccolta, perché un suo eventuale eccesso potrebbe interferire con la corretta fermentazione del mosto.</p> <p>(9) Ammesso 1 trattamento annuo, indipendentemente dall'avversità; un ulteriore intervento è ammesso esclusivamente con finalità curative, con infezioni in atto, in zone collinari o su varietà molto sensibili (es. Aglianico, Fiano, Falanghina, Greco di Tufo, Malvasia di Candia e M. toscana, Montepulciano, ecc.).</p> <p>(10) Da impiegare in chiave preventiva, a partire dalla fase fenologica di germogli ben formati.</p> <p>(11) Con gli IBE al massimo 3 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(12) Ammessi non più di tre trattamenti annui con le strobilurine ed il famoxadone, indipendentemente dall'avversità da controllare, senza miscelare antiperonosporici a questi principi attivi, poiché efficaci anche contro la Peronospora.</p> <p>(13) Ammessi non più di tre trattamenti annui con le strobilurine ed il famoxadone, indipendentemente dall'avversità da controllare.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere vitigni a grappolo non serrato; • evitare lesioni agli acini; • assicurare il drenaggio delle acque in eccesso; • favorire l'arialeggiamiento dei grappoli con la potatura verde. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle cultivar più suscettibili, nelle zone a clima predisponente e nelle annate con andamento meteorologico favorevole alla malattia, intervenire nella fase di pre-chiusura del grappolo e ripetere il trattamento, se permangono condizioni meteorologiche di forte umidità, 3 settimane prima della raccolta, rispettando scrupolosamente i tempi di carenza; • nelle annate asciutte e sulle cultivar a grappolo spargolo sono sconsigliati i trattamenti in assenza di sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • iprodione (14) • procimidone (14) • clozolimate (14) • pirimetanil (15) • fludioxonil + cyprodinil (16) • solfito alcalini (17) • fenexamid • mepanipyrim • <i>Trichoderma harzianum</i> 	<p>(14) Con i derivati dicarbossimidici al massimo 1 trattamento annuo.</p> <p>(15) Al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dall'avversità.</p> <p>(16) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità.</p> <p>(17) Solo in caso di condizioni ambientali predisponesti in fase di maturazione.</p> <p>Al massimo 2 interventi annui contro questa avversità.</p> <p>(18) Con i ditiocarbammati massimo 3 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asportare e bruciare i tralci imbianchiti e portanti i picnidi del fungo; • non effettuare la trinciatura dei sarmenti, ma allontanarli dal vigneto. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo nei vigneti sicuramente infetti, effettuando due trattamenti a distanza di 8-12 giorni a partire dal germogliamento, con le dosi massime riportate in etichetta. • metiram (18) • mancozeb (18) 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal dell'Eска (<i>Stereum hirsutum; Phellinus ignarius</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;• proteggere i grossi tagli di potatura con mastici cicatrizzanti e disinfeettanti;• estirpare le piante fortemente attaccate;• segnare in agosto le piante affette;• asportare le parti di legno compromesse ed allevare dal legno sano un nuovo germoglio;• potare separatamente le piante infette, disinfeettando dopo ogni pianta gli attrezzi da pota con ipoclorito di sodio.		
FITOFAGI	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>)	<p>Installare le trappole a feromoni se si intende impiegare gli IGR o il <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>.</p> <p>Campionamento: esaminare 100 grappoli/ha, per accettare la presenza di uova e giovani larvette.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire con <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>, addizionando 0,5 Kg di zucchero/hL o con gli IGR sugli adulti ovidponenti, quindi dopo due settimane dall'inizio dei voli della generazione carpofaga; <p>Intervenire con gli insetticidi tradizionali al superamento delle seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la II generazione 15% di grappoli attaccati; • per la III generazione la soglia si abbassa al 10%. 	<p>Non sono ammessi trattamenti contro la I generazione antofaga. Al massimo 2 trattamenti annui contro questo fitofago, tranne che con il <i>Bacillus thuringiensis</i>.</p> <p>(19) Al massimo 1 trattamento annuo con gli indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(20) Al massimo 1 trattamento annuo con gli organofosforici, a prescindere dal fitofago.</p> <p>(21) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dal fitofago.</p>

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetti <i>(Panonychus ulmi,</i> <i>Eotetranychus carpini)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razionalizzare le pratiche culturali che predispongono al vigore vegetativo. <p>Campionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pre-germogliamento effettuare un controllo visuale per valutare il numero di uova su 100 gemme scelte a caso sul 5-10% dei ceppi/ha; • in caso siano presenti più di 10 uova/gemma, effettuare un campionamento subito dopo il le prime foglie distese, verificando la presenza di forme mobili degli acari su almeno 100 foglie scelte a caso. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i trattamenti antiodici con zolfo ventilato generalmente controllano anche questi fitofagi; • da germogliamento in poi, la soglia d'intervento viene raggiunta quando si hanno il 60-70% delle foglie occupate da acari fitofagi e meno del 20% di foglie con presenza di acari predatori. Questa soglia in estate si riduce al 30-40% di foglie occupate e sempre con meno del 20% di foglie con presenza di acari predatori. 		<p>Al massimo 1 trattamento annuo contro questi fitofagi. (22) Con questo p.a. al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dal fitofago.</p>
Cicaline <i>(Zygina rhanni, Empoasca vitis)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razionalizzare la difesa contro gli altri fitofagi per salvaguardare i numerosi antagonisti naturali. 		

21 Difesa fitosanitaria integrata dell'aglio

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Marciume fogliare (<i>Pseudomonas fluorescens</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni culturali; • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • irrigare con acque senza residui organici; • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi ed alla presenza di condizioni climatiche predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • idrossido di rame 	(1) AI massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.
CRITTOGAME Ruggine (<i>Puccinia allii</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asportare e distruggere i residui infetti; • effettuare ampie rotazioni culturali. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi ed alla presenza di condizioni climatiche predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti ramieci • azoxystrobin (1) 	

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.) Elminiosporiosi (<i>Helminthosporium</i> spp.) Marciume verde-azzurro (<i>Penicillium</i> spp.) Marciume bianco (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni colturali; • evitare i ristagni idrici; • sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo per la disinfezione secca o umida dei bulbilli. 	<ul style="list-style-type: none"> • dicloran (2) • iprodione (2) • procimidone (2) 	(2) Ammessi solo per disinfezione bulbilli.
FITOFAGI Mosca (<i>Suilla lurida</i> , <i>Delia antiqua</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare seme con buona germinabilità ed in quantità tale da assicurare una buona densità d'investimento. <p>Campionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllare il volo degli adulti con trappole alimentari (ciotole con alcool allilico o isopropilico diluito più alcool glioletilenico). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in occasione del volo di colonizzazione degli adulti. 	<ul style="list-style-type: none"> • triclorfon (3) 	(3) Al massimo 1 intervento annuo contro questi fitofagi.

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nematodi <i>(Ditylenchus dipsaci)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni culturali; • evitare avvicendamenti con cipolla, erba medica, fava, fragola, lattuga, pisello, sedano e spinacio. 		

22 Difesa fitosanitaria integrata dell'asparago

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI AV1 – Virus 1 dell'asparago AV2 – Virus 2 dell'asparago	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		(1) Al massimo 2 trattamenti annui con IBE. (2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.
CRITTOGAMAE Ruggine (<i>Puccinia asparagi</i>)	Agronomico: • adottare varietà resistenti o tolleranti; • effettuare la distruzione in autunno della parte aerea; • eseguire l'eliminazione in primavera delle piante di asparago selvatiche.	Chimico: • 20-30 giorni dopo la raccolta e fino ad agosto-settembre.	(3) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.
Stemfiliosi (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	Agronomico: • raccolta e distruzione dei residui culturali; • lavorare il terreno in autunno-inverno.	Chimico: • solo in presenza dei sintomi.	

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fusariosi <i>(Fusarium oxysporum f.sp. asparagi, F. moniliforme, F. solani, F. roseum)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;adottare ampie rotazioni. Chimico: <ul style="list-style-type: none">concia degli organi di moltiplicazione.		
Mal vitato <i>(Rhizoctonia violacea)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;adottare ampie rotazioni;distruggere le piante malate e quelle poste in loro vicinanza.		(4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago (per il p.a. teflutrin da effettuare in pre-emergenza esclusivamente in modo localizzato).
FITOFAGI			
Mosca grigia <i>(Delia platura)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">in pre-emergenza, solo se nelle annate precedenti sono state registrate infestazioni.	<ul style="list-style-type: none">fosalone (4)teflutrin (4)	(5) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Mosca dell'asparago <i>(Platyparea poeciloptera)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">solo in caso di elevata presenza di larve o di adulti.	<ul style="list-style-type: none">fosalone (5)	
Criocere <i>(Crioceris asparagi, C. duodecimpunctata)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">asportare e distruggere i foderi di incrisalidamento che emergono dal terreno.		(6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Cosside dell'asparago <i>(Parahyppia caestrum)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">asportare e distruggere i foderi di incrisalidamento che emergono dal terreno. Chimico: <ul style="list-style-type: none">trattamenti localizzati all'apparato radicale nel mese di luglio, solo nelle asparagie nelle quali nell'annata precedente è stata registrata l'infestazione.	<ul style="list-style-type: none">fosalone (6)	

23 Difesa fitosanitaria integrata del basilico

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
TSWV – Virus dell'avizzimento maculato del pomodoro	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		
CRITTOGAME			
Marciumi molli radicali e basali (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>basilici</i> , <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., ecc.)	Fisico: • solarizzazione; Agronomico: • adottare ampie rotazioni.		
Marciumi basali e fogliari (<i>Sclerotinia</i> spp., <i>Colletotrichum</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>)	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • eliminare i residui di piante infette. Chimico: • intervenire alla presenza dei sintomi.	1) Registrato solo per le Sclerotinie. • composti rameici • dicloran • <i>Coniothyrium minitans</i> (1)	
FITOFAGI	Chimico: • intervenire in presenza di forti infestazioni.	• piretro	
Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>)			

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Minatrice fogliare (<i>Liriomyza</i> spp.)	<p>Biologico: alla presenza degli adulti, in serra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lanciare 0,1-0,2 individui/mq del <i>Diglyphus isaea</i>, ripetendo il lancio qualora la parassitizzazione risultasse insufficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diglyphus isaea</i> 	
Tripide (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	<p>Chimico: intervenire in presenza di forti infestazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • piretro naturale 	
Nottue (<i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Autographa gamma</i>)	<p>Chimico: intervenire in presenza di infestazioni generalizzate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>dizawai</i> 	

24 Difesa fitosanitaria integrata della bietola da foglie e da costa

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME			
Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni culturali; • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	
Mal del Piede (<i>Phoma betae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente • effettuare ampie rotazioni culturali; • evitare ristagni idrici; • asportare e distruggere le piante infette. 		
Mal vinato (<i>Rhizoctonia violacea</i>)			
Marciume secco (<i>Rhizoctonia solani</i>)			
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo 	
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i> f.sp. <i>betae</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	
Ruggine (<i>Uromyces betae</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	

AVVERTERSI DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di infestazioni diffuse intervenire preferibilmente in maniera localizzata. 	<ul style="list-style-type: none"> • piretro • azadiractina 	
Mosca (<i>Pegomyia betae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asportare e distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di infestazioni diffuse alla comparsa dei primi attacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> • piretro • azadiractina 	

25 Difesa fitosanitaria integrata del carciofo

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
AMCV - Virus dell'arricciamento maculato	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		
AYRV - Virus della maculatura anulare gialla			
AVBV - Virus della scolorazione perennale	Il controllo in campo di tali virosi, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: • frangivento;		
CMV - Virus del mosaico del cetriolo	• siepi; • reti antiafidicide;		
ALV - Virus latente del carciofo	• pacciamatura.		
ALV - Virus italiano	latente		
BBWV - Virus dell'avizzimento della fava			
BYMV - Virus del mosaico giallo			
BATTERIOSI			
Marciume radicale (<i>Erwinia carotovora</i>)	Agronomico: var. <i>carotovora</i>	• impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • limitare le concimazioni azotate e le irrigazioni.	

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Peronospora <i>(Bremia lactucae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitare le concimazioni azotate e le irrigazioni. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei sintomi ed in presenza di condizioni favorevoli all'infezione. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • cimoxanil (1) (in miscela con rame) • fosetyl-alluminio • azoxystrobin (2) 	<p>Per il controllo di questa fitopatia sono consentiti al massimo 4 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(1) Al massimo 3 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Marciumi del colletto <i>(Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium roffsii, Rhizoctonia solani)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non forzare la coltura; • adottare ampie rotazioni; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del materiale di propagazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • dicloran • <i>Coniothyrium minitans</i> (3) 	<p>(3) Registrato solo per le Sclerotinie</p>
Tracheoverticilliosi <i>(Verticillium dahliae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • limitare le concimazioni azotate; • adottare ampie rotazioni; • distruggere i residui culturali infetti; • distruggere tempestivamente le piante infette. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ondio <i>(Leveillula taurica f. sp. cynarae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripulire la carciofaria; • eliminare la vegetazione vecchia. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo • esaconazolo (4) • propiconazolo (4) • tetraconazolo (4) • pyrifenoxy (4) • azoxystrobin (5) 	<p>(4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti annuali indipendentemente dall'avversità.</p>
FITOFAGI			<p>Al massimo 2 trattamenti annuali contro questi fitofagi.</p>
Afidi			
Afide verde nerastro <i>(Brachycoccus cardui)</i>	Campionamento: determinare la presenza di colonie su almeno 50 piante scelte a caso.		
Afide della fava <i>(Aphis fabae)</i>			
Afide bruno-nerastro <i>(Dysaphis cynarae)</i>			

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue e Depressaria <i>(Gortyna xanthenes</i> <i>Depressaria erinaceella</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• eliminare le ceppaie ed i polloni infetti;• evitare il ristagno di umidità nel terreno. In carciofaie gravemente infestate l'anno precedente se s'intende intervenire chimicamente, installare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli.		(6) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità
	Chimico: Intervenire nel periodo più intenso dei voli e comunque prima che le larve svolgano vita endofitica: <ul style="list-style-type: none">• il controllo della <i>Gortyna</i> va fatto in inverno;• il controllo della <i>Depressaria</i> in autunno.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Bacillus thuringiensis</i> dimetoato (6)	
Mosca dei capolini <i>(Terellia fuscicornis)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• intervenire in presenza di gravi infestazioni, nella fase di sviluppo dei capolini.	<ul style="list-style-type: none">• esche proteiche con dimetoato (7)	(7) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago.
Cassida del carciofo <i>(Cassida deflorata)</i>	Chimico: intervenire in presenza di gravi infestazioni, nella fase di sviluppo dei capolini.	<ul style="list-style-type: none">• bifentrin (8)	(8) Con i piretroidi al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Nematodi galligeni <i>(Meloidogyne spp.)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• in caso di presenza evitare l'impiego di coltivar suscettibili.		
Limacce e chiocciole <i>(Canthareus aperta, Mylax gagates)</i>	Chimico: intervenire in presenza di gravi infestazioni.	<ul style="list-style-type: none">• esche avvelenate con metaldeide	
Roditori <i>(Apodemus sylvaticus,</i> <i>Pitymus savi)</i>	Chimico: intervenire a fine inverno, in caso di presenza, in corrispondenza dei nidi.	<ul style="list-style-type: none">• esche avvelenate a base di clorofacinone (9)	(9) Scegliere formulazioni che limitino il danno alla fauna.

26 Difesa fitosanitaria integrata della carota

AVVERTERITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Alternaria (<i>Alternaria dauci</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; – effettuare ampie rotazioni culturali; – effettuare concimazioni equilibrate; – asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – intervenire solo alla comparsa dei sintomi ed alla presenza di condizioni climatiche predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • difenoconazolo (1) • azoxystrobin (2) 	<p>(1) Al massimo 1 trattamento annuo</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Marciumi basali (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – effettuare ampie rotazioni culturali; – effettuare concimazioni azotate equilibrate; – evitare ristagni idrici; – asportare e distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla presenza di condizioni climatiche predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • dicloran (3) • <i>Coniothyrium minitans</i> (4) 	<p>(3) Al massimo 1 trattamento annuo</p> <p>(4) Registrato solo per le Sclerotinie.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	Chimico: • intervenire alla comparsa dei sintomi.	• zolfo • azoxystrobin (5)	(5) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità
FITOFAGI			
Mosca della carota (<i>Psila rosae</i>)	Agronomico: • effettuare ampie rotazioni culturali; • realizzare semine ritardate; • asportare e distruggere le piante infette.		
Mosca gialla della carota (<i>Psila fimetaria</i>)	Installare trappole cromoattractive		
	Chimico: • in presenza di attacchi alle colture precedenti e limitatamente alle semine primaverili-estate.	• diazinone (6) • piretro • azadiracina	(6) Trattamento localizzato al terreno.
Afide verde della carota (<i>Semaphis dauci</i>)	Chimico: • in presenza di infestazioni diffuse.	• piretro • pirimicarb	
Afide verdastro delle ombrellifere (<i>Hyadaphis foeniculi</i>)			
Afide giallastro delle ombrellifere (<i>Cavarrella aegopodi</i>)			
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	Chimico: • in caso di accertata presenza trattare in presemina o pretrapianto in modo localizzato lungo la fila.	• furatiocarb • teflutrin • benfuracarb	

27 Difesa fitosanitaria integrata del cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo broccolo, cavolo verza, broccoletto di rapa e ravanello

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI	<p>CaMV - virus del mosaico del cavolfiore TuMV - virus del mosaico della rapa CMV - virus del mosaico del cetriolo</p> <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare concimazioni equilibrate; • distruggere le piante infette; • programmare la coltura lontano da altre suscettibili; • eliminare le infestanti dai bordi degli appezzamenti. <p>Il controllo in campo di tali virosi, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frangivento; • siepi; • reti antiafidie; • pacciamatura. 		
CRITTOGAMAE	<p>Ernia delle crucifere <i>(Plasmiodiphora brassicae)</i></p> <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare cv poco suscettibili; • effettuare ampie rotazioni; • favorire il drenaggio delle acque; • correggere i terreni acidi; • impiegare concimi alcalini. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora <i>(Peronospora brassicae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> adottare ampie rotazioni; impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; impiegare a cv resistenti; raccogliere e distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di attacchi precoci. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici propamocarb (1) metalaxil (2) metalaxil M (3) 	(1) Non registrato per ravanello. (2) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. Registrato solo su cavolo verza. (3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità registrato solo per cavolfiore e cavolo broccolo.
Alternaria <i>(Alternaria brassicae, A. brassicola)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare ampie rotazioni; distanziare le semine; effettuare concimazioni equilibrate; raccogliere e distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in presenza di sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici 	
FITOFAGI Afidi <i>(Myzus persicae, Brevicoryne brassicae)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la soglia di intervento è pari al 10% di piante con colonie, se sono stati evidenziati casi di virosi la soglia di intervento si riduce all'1% di piante con colonie. 	<ul style="list-style-type: none"> piretro pirimicarb (4) (5) 	(4) Solo in caso di gravi infestazioni. (5) Non registrato su ravanello.

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue fogliari <i>(Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Pieris rapae)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire con gli IGR alle prime ovideposizioni; intervenire su larve di 1° età; intervenire su larve mature. 	<ul style="list-style-type: none"> • esaflumuron (6) • teflubenzuron (7) • lufenuron (8) • triflumuron • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> • azadirachtina (9) • indoxacarb • fenitroton (10) • etofenprox (10) 	<p>(6) Registrato solo per cavolfiore. (7) Registrato solo per cavolo e non per ravanello, efficace anche contro la Cavolaia (<i>Pieris brassicae</i>). (8) Al massimo 2 trattamenti annui, registrato solo sul "cavolo a testa", efficace anche contro la Cavolaia (<i>Pieris brassicae</i>). (9) Registrato solo su cavolfiore, cavolo cappuccio e cavolo verza. (10) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dall'avversità.</p>
Insetti terricoli <i>(Agriotes spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> lavorare il terreno in superficie nel periodo dell'ovideposizione (Maggio). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di accertata presenza trattare il terreno in presemina o pre-trapianto in modo localizzato lungo la fila. 	<ul style="list-style-type: none"> • foxtail (11) • teflutrín (12) 	<p>(11) Non registrati per ravanello. (12) Non registrato per cavolo broccolo, cavolo verza, broccoletto di rapa e ravanello, da impiegare in maniera localizzata lungo la fila per al massimo 1 trattamento annuo.</p>
Altica <i>(Phyllotreta spp.)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire alla prima comparsa degli adulti, nelle prime ore del mattino. 	<ul style="list-style-type: none"> • fenitroton (13) • triclorfon (13) (14) 	<p>(13) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità. (14) Non registrato su ravanello.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mosca del cavolo (<i>Hylemia brassicae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione delle crucifere spontanee e dei residui delle precedenti colture; • anticipare la semina delle cv primaverili; • preferire cv invernali; • effettuare lavorazioni superficiali. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al terreno alla semina o al trapianto 	<ul style="list-style-type: none"> • teflutrin (15) • triclorfon (16) 	<p>(15) Non registrato per cavolo broccolo, cavolo verza, broccoletti di rapa e ravanello, da impiegare in maniera localizzata lungo la fila per al massimo 1 trattamento annuo.</p> <p>(16) Non registrato per ravanello, al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p>
Punteruoli (<i>Baris</i> spp., <i>Ceuthorrhynchus</i> spp.)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla presenza degli adulti 	<ul style="list-style-type: none"> • fenitrotion (17) 	<p>(17) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p>

28 Difesa fitosanitaria integrata del cetriolo, zucchino e zucca

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
CMV - virus del mosaico del cetriolo	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;		
ZYMV - virus del mosaico giallo zucchino	• effettuare concimazioni equilibrate; • distruggere le piante infette; • programmare la coltura lontano da altre suscettibili; • eliminare le infestanti dai bordi degli appezzamenti o in prossimità delle serre.		
WMV1-2 - virus 1 - 2 del mosaico cocomero	Il controllo in campo di tali virusi, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: • frangivento; • siepi; • reti antiafidicche.		
MYSV - virus del nanismo giallo del melone			
BATTERIOSI			
Maculature su foglie e frutti (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)	Agronomico: • adottare ampie rotazioni;		
Marciume molle (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	• impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare concimazioni equilibrate; • arieggiare le serre; • distruggere le piante infette; • evitare gli eccessi idrici e le lesioni alle piante; • distanziare le piante adeguatamente alla semina o al trapianto; • disinsettare gli attrezzi.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	<p>Agronomico:</p> <p>in serra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorire l'arieggiamento; in serra ed in pieno campo: <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui della coltura infetti; • limitare l'irrigazione evitando di bagnare la parte aerea. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire quando sono presenti i sintomi e/o si instaurano le condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo del fungo. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • propamocarb • dodina • fosetyl-alluminio (1) • cimoxanil (2) in miscela con rame • azoxystrob in (3) 	<p>(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendente dall'avversità; autorizzato solo su cetriolo.</p> <p>(2) Autorizzato solo su zucchino.</p> <p>(3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(4) Al massimo 2 trattamenti annui con IBE indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Autorizzati solo su zucchino e cetriolo.</p> <p>(6) Autorizzato solo su zucchino.</p> <p>(7) Ammessi non più di due trattamenti annui con le strobilurine indipendentemente dall'avversità da controllare.</p>
Ordio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli stessi interventi agronomici previsti per la peronospora. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • penconazolo (4) (5) • miclobutanol (4) (5) • bitertanolo (4) (5) • esaconazolo (4) (6) • fenbuconazolo (4) • pyrifeno (4) • azoxystrob in (7) • tetracconazolo (4) (5) • <i>Ampelomyces quisqualis</i> • trifloxystrob in (5) (7) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• favorire l'arieggiamento della serra;• limitare le irrigazioni;• evitare lesioni alle piante;• distruggere i residui della coltura infetti. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• alla comparsa dei sintomi.	<ul style="list-style-type: none">• dicloran• <i>Coniothyrium minitans</i>	
Antracnosi (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Cladosporiosi (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• gli stessi interventi agronomici previsti per la peronospora. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• gli stessi interventi previsti per la peronospora.		
FITOFAGI			
Afidi	Biologico: In serra <ul style="list-style-type: none">• distribuire 18-20 larve di seconda età/mq in uno due lanci quando vi è contatto tra le piante. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• soglia di intervento: intervenire se più del 50% delle piante presentano colonie dell'Afide delle cucurbitacee;• soglia di intervento: intervenire se più del 10% delle piante siano infestate dagli altri afidi;• se sono presenti focolai di piante vircosate, la soglia d'intervento si abbassa all'1%.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Chrysopera carnea</i>• piretro• pirimicarb (8)• azadirachtina (9)• pymetrozina (9) (10)• <i>Beauveria bassiana</i>	Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. In serra intervenire chimicamente solo se gli antagonisti non si sono insediati e comunque dopo almeno 7-10 gg dai lanci. (8) Autorizzato solo su zucchino, al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago. (9) Non registrato su zucca. (10) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)			
Afide del prezzemolo (<i>Dysaphis apifolia</i>)			
Afide a sifoni grossi della patata (<i>Rhopalosiphoninus latussiphon</i>)			

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Campionamento: esaminare le foglie, soprattutto di maggiore età, sul 10-15% delle piante da proteggere.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in serra, con densità di <i>T. urticae</i> inferiori a 0,5 individui/foglia, effettuare lanci di 5-6 predatori/mq, a livelli superiori (1-1,5 individui/foglia) effettuare lanci di 6-8 predatori/mq. Tali lanci vanno realizzati soprattutto sulle file esterne, in vicinanza dei pali di sostegno e, in caso di focali localizzati, concentrandoli nelle aree più infestate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza di focolai d'infestazione con un inizio di decolorazione delle foglie. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> 	<p>Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dal principio attivo utilizzato. (11) Autorizzato solo su cetriolo. (12) Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dal fitofago; l'uso del feniproximate non è consentito in serra. (13) Autorizzato solo su cetriolo e zucchino</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>	<p>Installare le trappole cromotropiche gialle.</p> <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interrare o bruciare i residui culturali, se non ci sono pupari parassitizzati dagli ausiliari; • eliminare le infestanti (potenziali focolai di infestazioni) dentro e fuori la serra; • usare reti antinsetto; • limitare le concimazioni azotate. <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> quando la temperatura notturna della serra è di almeno 16°C ed alla comparsa dei primi adulti, utilizzando 3 individui/mq fino al 60-70% di parassitizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di elevate infestazioni non controllate dagli ausiliari; • in caso di elevate infestazioni non controllate dagli ausiliari, alla comparsa delle prime forme giovanili. 	<p>(14) Autorizzato solo su cetriolo e zucchino. Al massimo 1 trattamento all'anno ed esclusivamente in pieno campo.</p> <p>(15) Non registrato su zucca.</p> <p>(16) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>	
Nematodi galligeni <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ampie rotazioni, con esclusione delle cucurbitacee e delle solanacee; • impiegare cv resistenti. 		

29 Difesa fitosanitaria integrata della cipolla

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE CRITTOGAMICHE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora (<i>Peronospora schleideni</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • assicurare un accurato drenaggio del terreno; • limitare le concimazioni azotate; • ridurre le irrigazioni; • distruggere i residui colturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • cimoxanil (1) • dodina • fenilammidici (benalaxil, metalaxil M) (2) • azoxystrobin (3) 	<p>(1) Al massimo 3 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo impiegato.</p> <p>(3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>	
Ruggine (<i>Puccinia porri</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere le varietà evitando quelle a maturazione tardiva; • effettuare ampie rotazioni; • distruggere i residui colturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa delle prime pustole o preventivamente solo su piante in vivaio o sulle colture portaseme. • composti rameici • penconazolo (4) • azoxystrobin (5) 	<p>(4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Botrite <i>(Botrytis squamosa, B. allii)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> evitare gli eccessi di umidità; limitare le concimazioni azotate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire alla comparsa dei primi sintomi; un secondo trattamento solo in condizioni di persistente umidità. 	<ul style="list-style-type: none"> diclofluanide (6) procimidone (7) 	<p>(6) Efficace anche nel controllo della Peronospora.</p> <p>(7) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Fusariosi <i>(Fusarium oxysporum f.sp. cepae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; adottare ampie rotazioni; impiegare varietà tolleranti; distruggere i residui colturali; eliminare le parti infette; immagazzinare i bulbi ben asciutti. 		
Malattie da conservazione <i>(Botrytis spp., etc.)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> immettere aria riscaldata a 30-35°C per 2-3 gg. e successivamente aria fredda per 1-2 gg. in modo da essiccare le tuniche esterne dei bulbi. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Mosca dei bulbi (<i>Delia antiqua, D. platura</i>)	Chimico: • soglia d'intervento: 2-3% di piante infestate.	• triclorfon	Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago.
Tripide (<i>Thrips tabaci</i>)	Chimico: • soglia d'intervento: 15-20 individui/pianta.	• fenitrotion (8) • lambda-cialotrina (9) • cipermetrina (9) • alfa-cipermetrina (9) • acrinatrina (E-FLO) (9) • azadiractina	Al massimo 2 trattamenti annui contro questo fitofago. (8) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago. (9) Al massimo 1 trattamento annuo con piretroidi indipendentemente dal fitofago e dal principio attivo utilizzato.
Nematodi (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Agronomico: • ricorrere a seme o piantine esenti da nematodi.		

30 Difesa fitosanitaria integrata del fagiolino

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI			
Maculatura alonata (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>) Maculatura comune, (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni colturali; • effettuare concimazioni equilibrate; • eliminare e distruggere la vegetazione infetta; • scegliere varietà tolleranti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di sintomi. • composti rameici 		
CRITTOGAME			
Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> <i>lindemuthianum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • scegliere varietà resistenti; • distruggere i residui culturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intervento è indispensabile solo nelle colture da seme; per quelle da consumo lo è solo in caso di piogge persistenti o di elevata umidità. • composti rameici 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ruggine <i>(Uromyces appendiculatus)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • scegliere varietà resistenti; • distruggere i residui culturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo in presenza di sintomi. • composti rameici 		
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare lesioni alle piante; • evitare semine troppo fitte; • limitare le concimazioni azotate. 		
Rizottoniosi <i>(Rhizoctonia solani)</i> Fusariosi <i>(Fusarium spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • scegliere varietà resistenti; • distruggere i residui culturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concia delle sementi. • tolclofos-metile 		

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	Chimico: • alla comparsa delle prime colonie.	• piretro • pirimicarb (1)	Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Nottue (<i>Agrotis</i> spp.)	Chimico: • intervenire in presenza di infestazione diffusa e se le larve non sono ancora scese in profondità.	• esche avvelenate con triclorfon • teflutrin (2) • etofenprox (3)	(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago in modo localizzato e solo in pieno campo. (3) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Campionamento: esaminare 100 foglie sul 10-15% delle piante da proteggere a partire dalla pre-fioritura. Chimico: • soglia d'intervento: 2-3 forme mobili per foglia.		Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago ponendo molta attenzione ai tempi di carenza.
Mosca (<i>Delia platura</i>)	Agronomico: • effettuare semine superficiali e non precoci. Chimico: • intervenire in un unico trattamento subito dopo la semina.	• bromopropilato	• esche avvelenate con triclorfon

31 Difesa fitosanitaria integrata del fagiolo

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERI			
Maculatura alonata (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>) Maculatura comune, (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni culturali; • effettuare concimazioni equilibrate; • eliminare e distruggere la vegetazione infetta; • scegliere varietà tolleranti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • in presenza di sintomi. 		
CRITTOGAME			
Antracnosi (<i>Colletotrichum</i> <i>lindemuthianum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • scegliere varietà resistenti; • distruggere i residui culturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intervento è indispensabile solo nelle colture da seme; per quelle da consumo lo è solo in caso di piogge persistenti o di elevata umidità. • composti rameici 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ruggine <i>(Uromyces appendiculatus)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • scegliere varietà resistenti; • distruggere i residui culturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo in presenza di sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare lesioni alle piante; • evitare semine troppo fitte; • limitare le concimazioni azotate; 		
Rizottoniosi <i>(Rhizoctonia solani)</i> Fusariosi <i>(Fusarium spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • scegliere varietà resistenti; • distruggere i residui culturali infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concia delle sementi. 	<ul style="list-style-type: none"> • tolclofos-metile 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Afidi: Afide delle fave (<i>Aphis fabae</i>) ecc.	Chimico: • alla comparsa delle prime colonie.	• piretro • pirimicarb (1)	Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Nottue (<i>Agrotis</i> spp.)	Chimico: • intervenire in presenza di infestazione diffusa e se le larve non sono ancora scese in profondità.	• esche avvelenate con triclorfon • teflutrin (2)	(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago in modo localizzato e solo in pieno campo.
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Campionamento: esaminare 100 foglie sul 10-15% delle piante da proteggere a partire dalla pre-fioritura.		Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago ponendo molta attenzione ai tempi di carenza.
	Chimico: • soglia d'intervento: 2-3 forme mobili per foglia.	• bromopropilato • azociclotin	
Mosca (<i>Delia platura</i>)	Agronomico: • effettuare semine superficiali e non precoci.		
	Chimico: • intervenire in un unico trattamento subito dopo la semina.	• esche avvelenate con triclorfon	

32 Difesa fitosanitaria integrata della fava da granella

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
CMV - virus del mosaico del cetriolo BBWV - virus della maculatura clorotica, BYMV - virus del mosaico grave BBSV - virus dell'imbrunitamento della fava BBTMV - virus del mosaico vero	Agronomico: • programmare la coltura lontano da altre suscettibili; • eliminare le erbe infestanti dai bordi degli appezzamenti; • distruggere le piante infette.		
CRITTOGAME			
Botrite (<i>Botrytis fabae; B. cinerea</i>)	Agronomico: • distruggere le piante infette; • adottare ampie rotazioni.		
Ascochitosi (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • distruggere le piante infette.		
Ruggine (<i>Uromyces fabae</i>)	Agronomico: • scegliere varietà poco recettive; • distruggere le piante infette; • adottare ampie rotazioni. Chimico: • intervenire in presenza di sintomi.		• composti rameici

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Afidi (<i>Aphis fabae</i> , ed altri)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare le piante erbacee spontanee. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo in caso di gravi infestazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • piretrine • pirimicarb 	<p>Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal principio attivo utilizzato.</p>

33 Difesa fitosanitaria integrata del finocchio

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Marciumi molli (<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni colturali con cereali per almeno 2 anni; • effettuare concimazioni azotate equilibrate; • evitare ristagni idrici e scarso drenaggio; • adottare la pacciamatura plastica; • adottare l'irrigazione localizzata (in serra); • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi ed all'ingrossamento del grumolo. 	<ul style="list-style-type: none"> • ossicloruro di rame e calcio 	

AVVERTERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Peronospora (<i>Plasmopara niveai</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni colturali; • effettuare concimazioni equilibrate; • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi ed alla presenza di condizioni climatiche predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	
Fitoflora (<i>Phytophthora syringae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni colturali; • effettuare concimazioni equilibrate; • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi ed alla presenza di condizioni climatiche predisponenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , S. <i>minor</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• effettuare ampie rotazioni colturali;• adottare basse densità d'impianto;• effettuare concimazioni azotate equilibrate;• evitare ristagni idrici;• asportare e distruggere le piante infette. Chimico: intervenire alla presenza di condizioni predisponibili prima della rincalzatura.		(1) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dall'avversità. • dicloran (1) • <i>Coniothyrium minitans</i>
Moria delle piantine (<i>Pythium</i> spp.)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• effettuare ampie rotazioni colturali.		
Rizottoniosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;• evitare ristagni idrici;• allontanare e distruggere le piante infette.		
FITOFAGI			
Afidi (<i>Dysaphis apifolia</i> , <i>Hyadaphis foeniculi</i> , <i>Cavariella aegopodii</i>)	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• in presenza di infestazioni diffuse.	<ul style="list-style-type: none">• piretro• lambda-cialotrina (2)	(2) Al massimo 1 trattamento annuo con piretroidi indipendentemente dal fitofago e dal principio attivo utilizzato.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue <i>(Agrotis spp.</i> <i>Mamestra brassicae)</i>	Chimico: • in presenza di infestazione diffusa	• <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	
Elateridi <i>(Agriotes spp.)</i>	Agronomico: • lavorare il terreno in superficie nel periodo dell'ovideposizione (Maggio). Chimico: • in caso di accertata presenza trattare il terreno in pre-semina o pre-trapianto in modo localizzato lungo la fila.	• foxim (3) • teflutrin (3)	(3) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.

34 Difesa fitosanitaria integrata della lattuga e dell'indivia

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI	<p>CMV - virus del mosaico del cetriolo</p> <p>LMV - virus del mosaico della lattuga</p> <p>AMV - virus del mosaico dell'erba medica</p> <p>TRV - virus "rattle" del tabacco</p> <p>BWYV - virus del giallume occidentale della betola</p>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● programmare la coltura lontano da altre suscettibili; ● eliminare le erbe infestanti dai bordi degli appezzamenti o in prossimità dei tunnel; ● limitare le concimazioni azotate; ● anticipare o ritardare l'epoca di semina o trapianto in modo da evitare i periodi di intensa attività migratoria degli afidi; ● distruggere le piante infette; ● impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. <p>Il controllo in campo di tali virosi, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● frangivento; ● siepi; ● reti antiafidicide; ● pacciamatura. 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI Marciume e necrosi (<i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vitians</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • limitare le concimazioni azotate e le irrigazioni (da evitare le irrigazioni a pioggia); • adottare ampie rotazioni; <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo in presenza di infezioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	<p>Al massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità.</p> <p>(1) Autorizzati solo su lattuga.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento all'anno, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Da non impiegare sotto tunnel.</p> <p>(4) Efficace anche contro <i>Pythium</i> spp.</p>
CRITTOGAME Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui colturali infetti; • adottare ampie rotazioni; • evitare semine o trapianti troppo fitti; • favorire il drenaggio del suolo. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei sintomi ed in presenza di condizioni favorevoli all'infezione. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • cimoxanil (1) in miscela con rame • fosetyl-alluminio(1) (2) • metalaxil (1) (2) (3) • oxadixil (2) (3) • propamocarb (4) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume del colletto (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>) Malattia parenchimatica (<i>Pythium</i> spp.)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">utilizzare varietà poco suscettibili;eliminare i residui di piante infette;arrieggiare i tunnel;evitare semine o trapianti troppo fitti; Fisico: <ul style="list-style-type: none">solarizzazione. Chimico: <ul style="list-style-type: none">effettuare trattamenti alla base delle piante durante le prime fasi vegetative.	Al massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità. (5) Al massimo 1 trattamento all'anno con dicarbossimidici. (6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità, autorizzato solo in pieno campo. (7) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. (8) Registrato solo per le Sclerotinie	Al massimo 2 trattamenti all'anno contro questa avversità. (5) Al massimo 1 trattamento all'anno con dicarbossimidici. (6) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità, autorizzato solo in pieno campo. (7) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. (8) Registrato solo per le Sclerotinie
FITOFAGI	Afidi Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide del ribes nero (<i>Nasonovia ribisnigri</i>) Afidone verdastro delle lattughe (<i>Acyrtosiphon lactucae</i>) Afide giallastro della lattuga (<i>Hyperomyzus lactucae</i>)	Biologico: <ul style="list-style-type: none">in serra lanciare <i>Aphidius colemani</i> (0.5/mq) e <i>Aphydoletes aphidimyza</i> (1/mq). Campionamento: visionare 50 piante/100mq. Chimico: <ul style="list-style-type: none">intervenire se più del 50% delle piante sono infestate da colonie dell'Afide delle cucurbitacee;intervenire se più del 10% delle piante sono infestate da altre colonie afidiche;in presenza di focolai di piante virose la soglia si abbassa comunque all'1%.	Al massimo 2 interventi annui contro questi fitofagi. (9) Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dal fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Minatrice fogliare <i>(Liriomyza</i> spp.)	Posizionare le trappole cromotropiche per monitorare gli adulti. In pieno campo, solo con temperature superiori ai 10°C. Biologico: alla presenza degli adulti, in serra: • lanciare 0,1-0,2 individui/mq del <i>Diglyphus isaea</i> , ripetendo il lancio qualora la parassitizzazione risultasse insufficiente. Chimico: • in pieno campo intervenire alla presenza degli adulti; • in serra intervenire in caso di gravi infestazioni non controllate dagli ausiliari.	• <i>Diglyphus isaea</i> • teflutrin (10) • ciromazina (11) • azadiractina	(10) Autorizzato solo su lattuga. Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago, da non impiegarsi in serra e da usare esclusivamente in maniera localizzata. (11) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago, autorizzato solo su lattuga.
Nottue <i>(Autographa gamma, Agrotis</i> spp.)	Chimico: • intervenire in presenza di infestazioni generalizzate.	• <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> • deltametrina (12) • ciflutrin (12) (13) • zeta cipermetrina (12) (13) • bifentrin (12) • azadiractina • etofenprox (14)	(12) Al massimo 1 trattamento all'anno con piretroidi indipendentemente dal fitofago e dal principio attivo utilizzato. (13) Autorizzato solo su lattuga. (14) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Elateridi <i>(Agriotes spp.)</i>	Chimico: • intervenire in presenza di infestazioni generalizzate o nel caso di danni accertati sul ciclo culturale precedente.	• teflutrin (15)	(15) Autorizzato solo su lattuga. Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago da non impiegarsi in serra e da usare esclusivamente in maniera localizzata.
Limacce	Chimico: • interventi serali con esche avvelenate sulle fasce perimetrali.	• esche avvelenate con metaldeide	

35 Difesa fitosanitaria integrata della melanzana

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI CMV - virus del mosaico del cetriolo AMV - virus del mosaico dell'erba medica	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> ● programmare la coltura lontano da altre suscettibili; ● eliminare le erbe infestanti dai bordi degli appezzamenti o in prossimità dei tunnel; ● limitare le concimazioni azotate; ● distruggere le piante infette; ● impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. <p>Il controllo in campo di tali virosi, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● frangivento; ● siepi; ● reti antiafidicche; ● pacciamatura. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Marciume pedale (<i>Phytophthora capsici</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • sistemare accuratamente il terreno, per evitare ristagni idrici; • impiegare varietà poco suscettibili; • impiegare acque di irrigazione non contaminate; • eliminare le piante infette. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfeccare i terricci per semenzai con vapore; • solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti alla base del fusto ai primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • propamocarb 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheoverticilliosi <i>(Verticillium dahliae e V. alboatrum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare ampie rotazioni; • estirpare le piante infette ai primi sintomi; • innestare su ibridi di pomodoro resistenti. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solarizzazione; • disinfezione i terricci per semenzai con vapore. 		
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare lesioni a foglie e frutti; • evitare gli impianti eccessivamente fitti; • arrengiare opportunamente gli ambienti protetti; • effettuare l'irrigazione per manichetta forata; • eliminare e bruciare ai primi sintomi gli organi colpiti. 		
Marciumi basali <i>(Phoma hycopersici, Sclerotinia sclerotiorum, Thielaviopsis basicola)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare ampie rotazioni; • estirpare le piante infette ai primi sintomi; • assicurare un accurato drenaggio delle acque; • effettuare concimazioni equilibrate; • evitare semine o trapianti troppo fitti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Al massimo 1 trattamento annuo. (2) Con i dicarbossimidici al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità. (3) Registrato solo per le Sclerotinie <ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • dodina • dicloran (1) • iprodione (2) • <i>Coniothyrium minitans</i> (3) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI	<p>Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle uova; • in presenza di giovani larve; • su larve già sgusciate. 	<ul style="list-style-type: none"> • teflubenzuron • esaflumuron • lufenuron (4) • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> o <i>kurstaki</i> (ceppo EG 2424) • azadiractina • fosalone (5) • fenitrotion (5) • imidacloprid (5) 	<p>(4) Al massimo 2 trattamenti annuali a prescindere dal fitofago.</p> <p>(5) Al massimo 1 trattamento annuo con un prodotto a scelta tra questi 3 principi attivi e solo nel caso ci sia massiccia presenza di adulti ed i trattamenti ovo-larvicidi non abbiano sortito effetto.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)	Fisico: • installare ad inizio del ciclo culturale. Biologico: • sotto serra iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi; distribuire 15-20 larve/mq, in uno o più lanci quando vi è contatto tra le piante; introdurre 4-8 individui/mq, ripartiti in 4-6 lanci a cadenza settimanale; lanciare 20-30 larve per focolaio. Chimico: • in pieno campo le soglie sono le seguenti: più del 50% delle piante con colonie dell'Afide delle cucurbitacee o più del 10% delle piante infestate dagli altri afidi. In presenza di focolai di piante virose la soglia scende all'1%; • in serra intervenire solo in caso di attacco grave, specialmente quando le piante non si toccano, attendendo almeno 7-10 giorni dai lanci e limitando il trattamento, preferibilmente, ai principali focolai di infestazione.	<ul style="list-style-type: none"> • reti anti-afidiche • <i>Chrysoperla carnea</i> • <i>Aphidius colemani</i> (6) • <i>Harmonia axyridis</i> (7) 	Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fito fagi. (6) Questo antagonista integra l'azione delle Crisope, quando vi è contemporanea presenza di "afidi verdi" ed "afidi neri", o prevalgono questi ultimi. (7) Da usare solo nei focolai di infestazione, in aggiunta ai precedenti antagonisti. (8) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fito fago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum;</i> <i>Bemisia tabaci</i>)	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare abbondanti lavaggi. <p>Biologico:</p> <p>Installare trappole cromotropiche gialle (1 ogni 100 mq).</p> <p>Alle prime catture di <i>T. vaporariorum</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare lanci di 12-20 pupari/mq di <i>Encarsia formosa</i> • ripartiti in 4 lanci settimanali; <p>Alle prime catture di <i>Bemisia tabaci</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare lanci di 1 ind/mq di <i>Macrolophus caliginosus</i> • ripartiti in 2-3 lanci settimanali; <p>Effettuare i lanci di questo parassitoide in ragione di 8-16 pupari/mq, ripartiti in 4 lanci settimanali.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza di 10 stadi giovanili/foglia. Distanziare l'intervento chimico di almeno 7-10 gg. dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Encarsia formosa</i> • <i>Macrolophus caliginosus</i> • <i>Eremocerus mondus</i> • <i>piretro</i> • <i>buprofezin</i> • <i>etofenprox</i> (9) • <i>Beauveria bassiana</i> • <i>azadiractina</i> 	<p>(9) Al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi <i>(Frankliniella occidentalis;</i> <i>Thrips tabaci)</i>	<p>Biologico: Installare trappole cromotropiche azzurre (1 ogni 50 mq).</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza introdurre il predatore con 1 o più lanci, in ragione di 2-3 individui/mq. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di gravi infestazioni effettuare trattamenti, possibilmente localizzati ai focolai di infestazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orius laevigatus</i> • piretro • lufenuron (10) • etofenprox (11) • clorpirifos-metile (11) • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (10) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dal fitofago. (11) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico: • alla presenza in serra delle prime forme mobili introdurre con lanci ripetuti l'antagonista, in misura di 12-16 predatori/mq.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di gravi infestazioni effettuare il trattamento in modo localizzato sui focolai. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> 	<p>Al massimo 1 trattamento annuo contro questo fitofago. (12) Al massimo 1 trattamento annuo con uno di questi 2 p.a. contro questo fitofago indipendentemente dal principio attivo. (13) Si consente l'impiego solo in pieno campo.</p> <p>exitazox tebufenpirad (12) fenazaquin (12) abamectina (12) feniproximate (13) bromopropilato benzossimato clofentezine • <i>Beauveria bassiana</i></p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Liriomyza huidobrensis <i>(Liriomyza huidobrensis)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installare trappole cromotropiche gialle. • alla cattura di 20 adulti/trappola e/o alla comparsa delle prime mine o dei primi punti di suzione effettuare i lanci, in misura di 0,2 -0,5 individui/mq, ripartiti in 2-3 lanci. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso si riscontrino numerose mine sotto epidermiche o punture di nutrizione e/o ovideposizione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diglyphus isaea</i> <ul style="list-style-type: none"> • ciromazina (14) • esaflumuron • azadirachtina 	(14) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Nematodi galligeni <i>(Meloiodogyne spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare ampie rotazioni; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. <p>Fiisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfeccare i semenzai con vapore; • solarizzazione. 		

36 Difesa fitosanitaria integrata del melone e cocomero

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
CMV - virus del mosaico del cetriolo	Agronomico: ● impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;		
ZYMV - virus del mosaico giallo dello zucchino	● effettuare concimazioni equilibrate; ● distruggere le piante infette;		
WMV1-2 - virus 1 - 2 del mosaico cocomero	● programmare la coltura lontano da altre suscettibili; ● eliminare le infestanti dai bordi degli appezzamenti o in prossimità delle serre.		
MYSV - virus del nanismo giallo del melone	Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: ● frangivento; ● siepi; ● reti antiafidicie; ● pacciamatura.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
BATTERIOSI	<p>Maculature su foglie e frutti <i>(Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Iachrymans</i>)</p> <p>Marciume molle <i>(Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>)</p> <p>Avvizzimento <i>(Erwinia tracheiphila)</i></p>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare concimazioni equilibrate; • adottare ampie rotazioni; • arrieggiare le serre; • distruggere le piante infette; • evitare gli eccessi idrici; • evitare lesioni alle piante; • evitare semine o trapianti troppo fitti; • disinfezionare gli attrezzi; • evitare di irrigare con acque contenenti residui organici. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di sintomi. • composti rameici 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui della coltura infetti; • favorire l'arieggimento; • limitare l'irrigazione soprattutto sulla parte aerea. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pieno campo intervenire se sono presenti i sintomi e/o si instaurano le condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo del fungo. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici fosetyl-alluminio (1) • propamocarb • dimetomorf (2) • azoxystrobin (3) 	<p>(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità, autorizzato solo su melone.</p> <p>(3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui della coltura infetti; • favorire l'arieggimento; • limitare l'irrigazione soprattutto sulla parte aerea. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo • bupirimate (4) • fenarimol (5) • miclobutanol (5) • esaconazolo (5) (6) • fenbuconazolo (5) • propiconazolo (5) (6) • triadimenol (5) (6) • pyrifenoxy (5) (6) • quinoxifen • azoxystrobin (7) • <i>Ampelomyces quisqualis</i> • trifloxystrobin (7) 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal principio attivo impiegato.</p> <p>(4) Non registrato su cocomero.</p> <p>(5) Al massimo 1 trattamento annuo con gli IBE indipendentemente dal principio attivo impiegato.</p> <p>(6) Autorizzati solo su melone.</p> <p>(7) Ammessi non più di due trattamenti annui con le strobilurine indipendentemente dall'avversità da controllare.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancro gommoso <i>(Didymella bryoniae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; scegliere varietà resistenti o tolleranti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso di infezioni in atto intervenire tempestivamente. 	<ul style="list-style-type: none"> (8) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. 	
Tracheofusariosi <i>(Fusarium oxysporum f. sp. melonis)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> impiegare varietà resistenti; innestare su specie resistenti; evitare lesioni alle radici durante il trapianto (è buona prassi usare le plantine allevate in blocchetti di torba). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> concia del seme. 	<ul style="list-style-type: none"> (9) Ammessi esclusivamente per la concia. 	
Fusariosi della radice <i>(Fusarium solani f.sp. cucurbitae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> distruzione i residui della coltura infetti; impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; adottare ampie rotazioni; preferire nitrati di calcio e potassio alla concimazione con azoto ammoniacale. 	<ul style="list-style-type: none"> derivati benzimidazolici (9) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arreaggiare frequentemente le serre; • limitare le irrigazioni; • evitare lesioni alle piante e distruggere i residui della coltura infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei sintomi. 		<p>(10) Al massimo 1 intervento annuo.</p>
FITOFAGI	<p>Afidi:</p> <p>Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)</p> <p>Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in serra effettuare lanci di Crisopa, distribuire 20-30 larve/mq in uno due lanci quando vi è contatto tra le piante; • con T > 15°C distribuire 2-3 pupe/mq di <i>Aphidoletes aphidimyza</i> in 2 lanci dopo 2-4 settimane. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia di intervento: più del 50% delle piante con colonie dell'Afide delle cucurbitacee; • soglia di intervento: più del 10% delle piante con colonie dell'Afide verde del pesco; • se sono presenti focolai di piante virose la soglia si riduce all'1%. 	<p>Al massimo 2 trattamenti anni contro questi fitofagi.</p> <p>Nel caso si rendano indispensabili trattamenti aficidi dopo i lanci, risulta necessario attendere un periodo di 7-10 gg.</p> <p>(11) Al massimo 1 trattamento annuo, su coltivazioni gravemente infestate l'anno precedente.</p> <p>(12) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dal fitofago, autorizzato solo su melone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Chrysoperla carnea</i> • <i>Aphidoletes aphidimyza</i> • pirimicarb • piretro • imidaclorpid (11) • etofenprox (12) • pymetrozine (12) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interrare o bruciare i residui colturali, se non ci sono pupari parassitizzati dagli ausiliari; • eliminare le infestanti dentro e fuori la serra; • usare reti antinsetto; • limitare le concimazioni azotate. <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installare trappole cromotropiche gialle; • controllare gli apici vegetativi, alla comparsa dei primi adulti si consiglia di effettuare dei lanci di <i>Encarsia formosa</i>, 4-6 pupari/mq ogni 7-15 gg. fino a 4-6 lanci, quando la temperatura notturna della serra è di almeno 16°C. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in serra, nel caso in cui il controllo biologico risultasse inefficace; • in pieno campo, in presenza di più di 10 stadi giovanili per foglia. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Encarsia formosa</i> • buprofezin (13) • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 1 trattamento annuo per il controllo di questi fitofagi.</p> <p>(13) Non autorizzato su cocomero.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> ; <i>Thrips tabaci</i> ; <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	<p>Biologico: installare trappole cromotropiche azzurre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa in serra effettuare 1 o più lanci di <i>Orius</i> con 0,5-1 ind/mq. (in mucchietti di 15-20 individui per favorire l'accoppiamento). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pieno campo intervenire in caso di infestazione; • in serra intervenire nel caso in cui il controllo biologico non risulti efficace e comunque distanziare i lanci di almeno 7-10 gg dal trattamento. 	<p>• <i>Orius</i> spp.</p> <p>• piretro naturale etofenprox (14) azadiractina • <i>Beauveria bassiana</i></p>	(14) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità, autorizzato solo su melone.
Minatori fogliari (<i>Liriomyza trifolii</i>)	<p>Biologico: Installare trappole cromotropiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prime catture ed alla comparsa delle gallerie lanciare il <i>Diglyphus isaea</i> 0,1-0,2 ind/mq. In uno o due lanci. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciromazina (15) • azadiractina 	<p>• <i>Diglyphus isaea</i></p> <p>• ciromazina (15) azadiractina</p>	(15) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sera introdurre con 2 lanci ripetuti l'antagonista <i>Phytoseiulus persimilis</i> • in pieno campo sono efficaci lanci localizzati. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza di gravi focolai d'infestazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> • tebufenpirad (16) • fenazaquin (16) • exitiazox (17) • benzossinato (17) • clofentezine (17) • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 2 trattamenti acaricidi annui indipendentemente dal principio attivo impiegato.</p> <p>(16) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago e dal p.a.</p> <p>(17) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago e dal p.a., autorizzato solo su melone.</p>
Elateridi <i>(Agriotes spp.)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di accertata presenza intervenire al trapianto in maniera localizzata. 	<ul style="list-style-type: none"> • tefluthrin • benfuracarb (18) 	(18) Registrato solo su melone.
Nematodi galligeni <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare ampie rotazioni, con esclusione delle cucurbitacee e delle solanacee; • impiegare cv resistenti. 		

37 Difesa fitosanitaria integrata della patata

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI PVX - Virus X della patata PVY - Virus Y della patata PLRV - Virus dell'accartocciamento della patata	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> ● utilizzare tuberi-seme sani e certificati ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; ● eliminare le piante spontanee ed i residui di tuberi di colture precedenti; ● adottare idonee rotazioni colturali; ● estirpare e bruciare le piante sicuramente infette. <p>Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● frangivento; ● siepi; ● reti antiafidicide; ● pacciamatura. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare tuberi-seme sani e certificati ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • scegliere varietà poco suscettibili; • adottare opportune distanze di semina; • effettuare concimazioni equilibrate; • evitare le irrigazioni eccessive e soprachioma; • essiccare la parte aerea prima della raccolta. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare trattamenti preventivi quando sussistono le condizioni ambientali favorevoli all'infezione (piogge, nebbie persistenti, elevata umidità relativa e temperature comprese tra 10 e 25°C). 	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità. (2) Al massimo 3 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità. (3) Con i derivati fenilammidici non più di 2 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità, e solo in caso di infezioni in atto. (4) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p> <p>• composti rameici • dodina • diclofluanide • dimetomorf (1) • cimoxanil (2) • metalaxil (3) • benalaxil (3) • oxadixil (3) • ditianon WG (granuli idrodispersibili) • famoxadone + cimoxanil (4) • iprovalicarb (2) • fluazinam (5) • fosfati Al+rame (1)</p>	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità. (2) Al massimo 3 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità. (3) Con i derivati fenilammidici non più di 2 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità, e solo in caso di infezioni in atto. (4) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Alternaria <i>(Alternaria solani)</i>	Chimico: • intervenire alla comparsa dei primi sintomi e solo nei primi stadi di sviluppo, perché successivamente i trattamenti antiperonosporici controllano efficacemente questa fitopatia.	• composti rameici	
Rizottoiosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	Agronomico: • utilizzare tuberi-seme sani e certificati ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare un piano di rotazione, possibilmente ampio ed includente specie non suscettibili; • ricorrere al pre-germogliamento; • effettuare semine poco profonde e sufficientemente distanziate; • eliminare i ristagni idrici, ricorrendo ad idonee sistemazioni idraulico-agrarie; • eseguire concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • allontanare e distruggere le piante infette. Chimico: • effettuare la concia del tubero-seme nei casi in cui si siano verificati problemi negli anni precedenti.	(6) Al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dall'avversità e solo mediante concia del tubero-seme.	
Marciume secco <i>(Fusarium solani)</i>	Agronomico: • evitare lesioni ai tuberi durante la raccolta; • effettuare un'accurata cernita dei tuberi, prima di immagazzinarli; • mantenere i locali di conservazione freschi, asciutti e ben aerati; • non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti.	• tolclofos-metile (6) • pencycuron (6)	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancrena secca (<i>Phoma exigua</i>)	Agronomico: ● scegliere varietà poco suscettibili; ● evitare lesioni di qualsiasi origine ai tuberi; ● distruggere tempestivamente i residui culturali contaminati; ● conservare i tuberi in locali idonei; ● non destinare alla semina i tuberi infetti.		
FITOFAGI	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	Chimico: ● esaminare, a partire dai primi stadi vegetativi, 50 piante/ettaro, scelte a caso nell'appezzamento, ed intervenire se si riscontrano più di 25 ovature; ● raggiunta la soglia, attendere che il 50% delle uova siano schiuse prima di effettuare il trattamento.	(7) ● <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> o var. <i>kurstaki</i> (Ceppo EG 2424) esaflumuron teflubenzuron lufenuron (7) imidacloprid (8) azadiractina (8) ● Al massimo 1 trattamento indipendentemente dal fitofago. ● Al massimo 1 intervento indipendentemente dal fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tignola <i>(Phthorimaea operculella)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">utilizzare tuberi-seme sani e certificati ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;effettuare ampie rotazioni che escludano per qualche anno le solanacee;impiegare varietà precoce ed a tuberificazione profonda, nelle zone notoriamente infestate;trapiantare ad 8-10cm di profondità;eseguire frequenti rincalzature;non ritardare la raccolta oltre la maturazione agronomica del prodotto;distruggere immediatamente i residui culturali;trasportare tempestivamente i tuberi nei locali di conservazione;proteggere con reti anti-insetto, a maglie di piccole dimensioni, tutte le aperture dei locali di conservazione;dopo lo svuotamento, effettuare periodicamente un'accurata disinfezione dei locali adibiti allo stocaggio dei tuberi;regolare la temperatura dei magazzini al di sotto dei 10°C.		(9) Effettuare la concia del tubero-seme e non utilizzare più di 1 volta all'anno indipendentemente dall'avversità da combattere; tale concia risulta efficace anche per il controllo di dorifora ed afidi. (10) Al massimo 1 trattamento annuo, localizzato nei solchi, se si usano sementi non conciate con imidaclorpid. (11) Alla prima rincalzatura, localizzato nei solchi e ben interrato, se si usano sementi non conciati con imidaclorpid. (12) Al massimo 1 trattamento annuo, localizzato nei solchi
Elateridi <i>(Agriotes spp.)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">evitare di irrigare in prossimità della raccolta, per ostacolare la risalita di questi fitofagi;attuare rotazioni includenti specie non suscettibili. Chimico: soglia d'intervento: 6 larve/mq, verificata mediante carotaggio del terreno in pre-semina.	<ul style="list-style-type: none">imidaclorpid (9)fipronil (10)teflutrin (11)carbosulfan (10)benfuracarb (12)	

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi: Afide della fava (<i>Aphis fabae</i>) Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	Chimico: <ul style="list-style-type: none"> • campionare almeno 50 piante/ettaro, scelte a caso nell'appennamento ed intervenire al superamento delle seguenti soglie di intervento: <ul style="list-style-type: none"> - per il genere <i>Aphis</i>: 50% di piante infestate; - per gli altri Afidi: 10% di piante infestate; - in presenza di focolai di piante virose la soglia è pari alla presenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • piretro • pirimicarb • imidacloprid (13) • azadirachtina • pymetrozine (13) 	Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (13) Non più di 1 trattamento annuo con questo prodotto, indipendentemente dall'avversità.
Nematodi (<i>Globodera spp.</i> ; <i>Meloidogyne spp.</i> ; <i>Pratylenchus spp.</i>)	Esegui l'analisi nematologica del terreno da destinare alla semina; Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • adoperare varietà resistenti nei terreni risultati infetti; • effettuare ampie rotazioni con piante non ospiti (cereali, leguminose, composite, liliacee, ombrellifere, ecc.). 		

38 Difesa fitosanitaria integrata del peperone

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI	<p>CMV – Virus del mosaico del cetriolo PVY – Virus Y della patata TMV – Virus del mosaico del tabacco ToMV – Virus del mosaico del pomodoro</p>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programmare la coltura lontano da altre suscettibili; • eliminare le erbe infestanti dai bordi degli appezzamenti o in prossimità delle serre; • limitare le concimazioni azotate; • distruggere le piante infette. <p>Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frangivento; • siepi; • reti antiafidicche; • pacciamatura. 	
BATTERIOSI	<p>Maculatura batterica <i>(Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>)</p>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • attuare un ampio piano di rotazione; • effettuare concimazioni equilibrate; • distruggere le piante infette; • irrigare con acqua priva di residui organici. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai primi sintomi. • composti rameici 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME <i>(Phytophthora capsici)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare una buona sistemazione del terreno per evitare i ristagni idrici; • non impiantare la coltura in terreni pesanti ed asfittici; • impiegare varietà poco suscettibili; • innestare le piantine su ibridi non suscettibili; • adoperare acque di irrigazione non contaminate; • adottare l'irrigazione localizzata; • eliminare immediatamente le piante affette. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solarizzazione; • disinfezione dei terricci per semenzai con vapore. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire ai primi sintomi, irrigando bene la base del fusto. 	<p>(1) Con i derivati fenilammidici effettuare non più di 1 trattamento annuo, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità.</p>	<p>composti rameici, propamocarb benalaxil (1) ditianon WG (granuli idrodispersibili) azoxystrobin (2)</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio <i>(Leveillula taurica)</i>	Chimico: • alla comparsa dei primi sintomi.	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo • triadimenol (3) • triadimefon (3) • penconazolo (3) • pyrifenoxy (3) • fenarimol (3) • nuarimol (3) • miclobutanil (3) • tetaconazolo (3) • azoxystrobino (4) • <i>Ampelomyces quisqualis</i> 	<p>(3) Con gli IBE al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità.</p>
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • assicurare un'adeguata aerazione degli ambienti protetti; • allontanare e distruggere gli organi colpiti; • limitare le concimazioni azotate; • evitare l'irrigazione sopra chioma. Chimico: <ul style="list-style-type: none"> • intervenire ai primi sintomi, esclusivamente laddove negli anni precedenti sono state registrate forti infestazioni non controllate con il mezzo agronomico. 	<ul style="list-style-type: none"> • iprodione • fludioxonil + cyprodinil • pirimetamil 	Al massimo un trattamento annuo contro questa avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI	<p>Afidi:</p> <p>Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)</p> <p>Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)</p> <p>Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)</p> <p>Fisico: • installare ad inizio del ciclo culturale.</p> <p>Biologico: iniziate i lanci alla presenza dei primi afidi: • distribuire 20-30 larve/mq, in uno o più lanci quando vi è contatto tra le piante; • introdurre 4-8 individui/mq, ripartiti in 4-6 lanci a cadenza settimanale; • lanciare 20-30 larve per focolaio.</p> <p>Chimico: • in pieno campo le soglie sono le seguenti: più del 50% delle piante con colonie dell'Afide delle cucurbitacee o più del 10% delle piante infestate dagli altri afidi. In presenza di focolai di piante vitrose la soglia scende all'1%; • in serra intervenire solo in caso di attacco grave, specialmente quando le piante non si toccano, distanziando il trattamento di almeno 7-10 giorni dai lanci e limitandolo, preferibilmente, ai principali focolai di infestazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • reti antiafidiche • <i>Chrysoperla carnea</i> • <i>Aphidius colemani</i> (5) • <i>Harmonia axyridis</i> (6) 	<ul style="list-style-type: none"> • piretro • pirimicarb • imidaclorpid (7) • azadiractina • pymetrozine (7) • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi.</p> <p>(5) Questo antagonista integra l'azione delle Crisope, quando vi è contemporanea presenza di "afidi verdi" ed "afidi neri", o prevalgono questi ultimi.</p> <p>(6) Da usare solo nei focolai di infestazione, in aggiunta ai precedenti antagonisti.</p> <p>(7) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripide americano <i>(Frankliniella occidentalis)</i>	<p>Biologico: installare trappole cromotropiche azzurre (1 ogni 50 mq);</p> <ul style="list-style-type: none"> • iniziare i lanci alle prime catture introducendo con 1 o più lanci 1-2 predatori/mq. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pieno campo intervenire alla comparsa dei primi individui; • in serra intervenire solo in caso di attacchi non controllabili con i predetti antagonisti, distanzianando il trattamento di almeno 7-10 giorni dai lanci e limitandolo, preferibilmente, ai principali focolai di infestazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orius majusculus</i> • <i>O. laevigatus</i> <ul style="list-style-type: none"> • piretro • clorpirifos-metile (8) • lufenuron (9) • azadiractina • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi.</p> <p>(8) Al massimo 1 trattamento annuo con questo p.a. indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(9) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dal fitofago.</p>
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico: alla comparsa delle prime forme mobili introdurre da 6-10 fino a 12-15 individui/mq, ripartiti in più lanci settimanali.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pieno campo con il 20-30% di foglie occupate; • in serra in presenza di focolai di infestazione con presenza di foglie decolorate. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> <ul style="list-style-type: none"> • exitiazox • tebufenpirad (10) • fenpiroximate (10) (11) • fenazaquin (12) • abamectina (12) • clofentezine • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi.</p> <p>(10) Al massimo 1 trattamento annuo con un prodotto a scelta tra questi tre.</p> <p>(11) Da impiegare solo in pieno campo.</p> <p>(12) Al massimo 1 trattamento annuo con uno di questi 2 p.a. indipendentemente dal fitofago</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	<p>Meccanico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle colture protette, installare le reti all'inizio del ciclo culturale; <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installare trappole a feromoni ed intervenire all'incremento delle catture. 	<ul style="list-style-type: none"> • reti antinsetto • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> (13) • teflubenzuron • esaflumuron • lufenuron (14) • indoxacarb 	<p>(13) Con questo prodotto effettuare trattamenti ripetuti nel periodo dell'ovideposizione.</p> <p>(14) Al massimo 2 trattamenti annui, a prescindere dal fitofago.</p>
Minatrice fogliare (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posizionare trappole cromotropiche gialle; • iniziare i lanci alle prime catture in ragione di 0,2-0,5 individui/mq, ripartiti in 2-3 lanci. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pieno campo: alla comparsa di mine sottoepidermiche o di punture di nutrizione ed ovideposizione; • in serra: se si riscontrano focolai di infestazione non controllati dagli ausiliari, intervenire ad almeno 7-10 giorni di distanza dai lanci 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diglyphus isaea</i> 	<p>(15) Al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dal fitofago.</p>

39 Difesa fitosanitaria integrata del pisello

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
TNV - virus della maculatura necrotica	Agronomico: ● evitare i ristagni idrici; ● evitare terreni troppo acidi e la monocultura.		
BATTERIOSI			
Maculature <i>(Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> ; <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ; <i>Pseudomonas viridisflava</i>)	Agronomico: ● impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; ● adottare ampie rotazioni; ● effettuare concimazioni equilibrate; ● eliminare dei residui della coltura infetti; ● irrigare con acque prive di residui organici. Chimico: ● ai primi sintomi. ● composti rameici		Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.
CRITTOGAME			
Peronospora <i>(Peronospora pisi)</i>	Agronomico: ● adottare rotazioni molto ampie; ● impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; ● ricorrere a varietà resistenti. Chimico: ● intervenire in caso di attacchi precoci.		
Antracosi <i>(Ascochyta spp.)</i>	● valgono le indicazioni date per la Peronospora.	● composti rameici ● cimoxanol in miscela con rame	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio <i>(Erysiphe polygoni)</i>	Agronomico: • adottare rotazioni molto ampie; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • ricorrere a varietà resistenti. Chimico: • intervenire solo in caso di forte infezione.	zolfo nuarimol penconazolo	(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
FITOFAGI			
Afidi: Afide della fava <i>(Aphis fabae)</i> Afidone verdastro del pisello <i>(Acyrtosiphon pisum)</i> Afide verde del pesco <i>(Myzus persicae)</i>	Chimico: • effettuare trattamenti localizzati in caso di forte infestazione.	piretro pirimicarb (1)	
Notte <i>(Mamestra brassicae)</i>	Chimico: • intervenire in presenza di larve e dei relativi danni; • solo in caso di forti infestazioni.	esche avvelenate con metaldeide bifentrin (2) ciflutrin (2) deltametrina (2) lambda-cialotrina (2)	(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.

40 Difesa fitosanitaria integrata del pomodoro da mensa in cultura protetta

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI	<p>CMV - virus del mosaico del cetriolo ToMV - virus del mosaico del pomodoro TSW - virus dell'avizzimento maculato del pomodoro PVY - virus Y della patata AMV - virus del mosaico dell'erba medica.</p>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare le piante ammalate e i residui infetti; • proteggere le aperture delle serre con reti antinsetto; • eliminare la flora spontanea presente sulle superfici aziendali improduttive. <p>Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frangivento; • siepi; • reti antiafidicide; • pacciamatura. 	<p>(1) Solo sulle piante colpite. Sospendere i trattamenti con temperature superiori a 27°C. (2) A distanza di almeno 15 gg. dal trapianto.</p>
BATTERIOSI	<p>Maculatura batterica (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)</p>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare ampie rotazioni; • effettuare concimazioni equilibrate; • distruggere i residui infetti; • irrigare con acque senza residui organici; • arieggiate le serre. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza della sintomatologia. • composti rameici (1) • acibenzolar-S-methyl (2) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancro batterico (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>) Batteriosi del fusto (<i>Pseudomonas corrugata</i>)	Agronomico: • estirpare e distruggere le piante che manifestano sintomi.		
CRITTOGAME Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	Agronomico: utilizzare varietà tolleranti; • arrieggiare le serre; • limitare le irrigazioni evitando l'irrigazione a pioggia. Chimico: in caso di umidità relativa elevata e temperature inferiori ai 25°C.	(3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità, anche in miscela con rame. (4) Al massimo 3 trattamenti annui con questo p.a., anche in miscela con rame. (5) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità ed in alternativa alla miscela con famoxadone. (6) Al massimo un trattamento annuo ed in alternativa all'azoxystrobin.	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cladosporiosi (<i>Cladosporium fulvum</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• arieggiate le serre;• limitare le irrigazioni evitando l'irrigazione a pioggia. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• in presenza di sintomi.	<ul style="list-style-type: none">• composti rameici<ul style="list-style-type: none">• ciproconazolo (7)• tetriconazolo (7)• azoxystrobin (8)	(7) Al massimo 2 trattamenti annui con IBE a prescindere dall'avversità. (8) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• arieggiate le serre;• limitare le irrigazioni evitando l'irrigazione a pioggia.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.) Septoriosi (<i>Septoria hcpersici</i>)	Agronomico: • valgono le norme di profilassi generale indicate per la Cladosporiosi. Chimico: • in caso di gravi attacchi.	• diclofuanide	
Tracheomicosi (<i>Verticillium</i> spp, <i>Fusarium</i> spp., <i>oxysporum</i> ff. spp.)	Agronomico: • adottare rotazioni con piante non suscettibili; • estirpare e distruggere le piante infette.		
Radice suberosa (<i>Pyrenopezha hcpersici</i>)	Agronomico: • utilizzare cultivar resistenti; • effettuare la rincalzatura delle piante; • effettuare irrigazioni localizzate (manichetta forata); • estirpare e distruggere le piante infette.		
FITOFAGI	 Afidii: Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Afide nero delle leguminose (<i>Aphis craccivora</i>) Afide della fava (<i>Aphis fabae</i>) Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>)	Biologico: • lancio di <i>Chrysoperla carnea</i> 18-20 larve II età /mq in 1-2 lanci. Agronomico: • proteggere le aperture delle serre. Chimico: • i trattamenti vanno effettuati in maniera localizzata distanziandoli almeno di 7-10 gg dai lanci, se gli antagonisti non si sono insediati.	(9) • <i>Chrysoperla carnea</i> (10) Al massimo 1 trattamento annuo, evitarne l'uso in caso si effettuino lanci con <i>Macrolophus caliginosus</i> . (11) Al massimo 1 trattamento annuo alla comparsa delle prime colonie, in impianti gravemente infestati l'anno precedente e con presenza di focolai di infezione virale. (12) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)</i>	<p>Biologico: Installare le trappole cromotropiche (1/100mq).</p> <p>Alle prime catture effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per colture a ciclo primaverile-estivo, lanci di Encarsia in misura di 4-6 pupari/mq in 4-6 lanci ogni 7-15 gg., con temperature notturne maggiori di 15°C; • per colture a ciclo estivo-autunnale, lanci di Encarsia in misura di 5-6 pupari/mq in 6-8 lanci ogni 7 gg.; dopo il trapianto, lanci di <i>Macrolophus caliginosus</i> in misura di 0,5ind./mq in 2 lanci ogni 15 gg. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia d'intervento: 10 neanidi/cmq/foglia; • i trattamenti vanno effettuati distanziandoli almeno di 7-10 gg dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Encarsia formosa</i> • <i>Macrolophus caliginosus</i> • buprofezin (12) • <i>Beauveria bassiana</i> • azadiracina • pymetrozina (12) 	<p>(12) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>
Minatori fogliari <i>(Liriomyza trifolii, L. bryoniae, L. huidobrensis)</i>	<p>Biologico: installare le trappole cromotropiche.</p> <p>• Alle prime catture degli adulti lanci di 0,1-0,2 parassitoidi/mq.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia d'intervento: > 2 mine/foglia; • i trattamenti vanno effettuati distanziandoli almeno di 7-10 gg dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dygliphush isaea</i> 	<p>(13) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>Al massimo 1 trattamento annuo per il controllo di questi fitofagi.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> controllare l'1% delle foglie vecchie, alla presenza del 40-50% di foglie con Ragnetto e con meno del 20% di Fitoseidi, introdurre questi ultimi fino ad instaurare un rapporto di 5/1 preda/predatore. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> qualora gli antagonisti non riescano a contenere il fitofago 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> • exitiiazox • tebufenpirad • fenazaquin • abamectina • clofentezine • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 1 trattamento per il controllo di questo fitofago.</p>
Triptide (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> installare trappole collanti azzurre; alla comparsa dei primi tripidi procedere ad uno o più lanci con 0,5-2 ind./mq. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di forte infestazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orius</i> spp. • piretrine • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>L'utilizzazione delle trappole luminose elimina i nottigli man mano che entrano in serra.</p> <p>(14) Registrato solo per Nottiglie fogliari.</p>
Nottue tericole (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. segetum</i>) Nottue fogliari (<i>Heliothis armigera</i>)	<p>Si consiglia l'installazione delle trappole luminose.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla presenza delle larve; alla schiusura delle uova o su larve ai primi stadi di sviluppo. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstakii</i> • indoxacarb (14) 	

41 Difesa fitosanitaria integrata del prezzemolo

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME			
Septoriosi (<i>Septoria petroselini</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare razionali avvicendamenti culturali; • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	
Oidio (<i>Erysiphe umbellifarum</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo 	
Rizottiosi (<i>Rhizoctonia solani</i>)	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solarizzazione per ridurre la carica d'inoculo nel terreno <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare un accurato drenaggio del terreno; • adottare ampi avvicendamenti culturali; • allontanare tempestivamente le piante malate. 		
FITOFAGI			
Afidi (<i>Dysaphis apifolia</i> , <i>Hyadaphis foeniculi</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo in caso di forti infestazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • piretro • pirimicarb 	
Mosca (<i>Liriomyza</i> spp.)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si riscontrano numerose mine sottoepidermiche o punture di nutrizione e/o ovideposizione. 	<ul style="list-style-type: none"> • ciromazina (1) 	(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal litofago.

42 Difesa fitosanitaria integrata della rucola

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME			
Peronospora (<i>Phytophthora brassicae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • effettuare un accurato drenaggio del terreno; • asportare e distruggere i residui infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	
Oidio	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo 	
Marciumi (<i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare i ristagni idrici; • eliminare i residui di piante infette; • arrengiare i tunnel. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare trattamenti alla base delle piante durante le prime fasi vegetative. 	<ul style="list-style-type: none"> • dicloran 	
Alternariosi (<i>Alternaria brassicola</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare e distruggere i residui di piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 		
Ruggine bianca (<i>Albugo candida</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo alla comparsa dei sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici 	

AVVERTERIA DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Afidi			
Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)	Chimico: • intervenire se più del 10% delle piante sono infestate	• piretro	
Afide ceroso del cavolo (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	da colonie afidiche.		
Altica (<i>Phyllotreta</i> spp.)	Chimico: • intervenire solo su piante giovani, in caso di infestazioni diffuse e nelle prime ore del mattino.	• triclorfon (1) • fenitrotion (1)	(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	Chimico: • intervenire in caso di infestazioni generalizzate o nel caso di danni accertati sul ciclo colturale precedente.	• foxim	

43 Difesa fitosanitaria integrata del sedano

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI CeMV - virus del mosaico del sedano CMV - virus del mosaico del cetriolo	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare dal campo le piantine malate ed i residui culturali infetti; • adottare rotazioni colturali adeguate. Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: <ul style="list-style-type: none"> • frangivento; • siepi; • reti antiafidicide; • pacciamatura. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Septoriosi <i>(Septoria apicola)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare razionali avvicendamenti colturali; • scegliere varietà poco suscettibili; • disinfezionare i semenzai; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • se l'infezione è in atto è opportuno limitare il transito all'interno della coltivazione ed evitare l'irrigazione per aspersione, che possono favorire il diffondersi della malattia. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conciare il seme qualora insorgano dubbi sulla sua sanità; • alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione. 	<ul style="list-style-type: none"> • tiram (1) • composti rameici • dodina • difenconazolo 	(1) Ammesso solo per la concia.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Oidio <i>(Erysiphe polygoni)</i>	Agronomico: • impiegare varietà resistenti o tolleranti al mal bianco. Chimico: • in caso di gravi attacchi.	• zolfo	
Cercosporiosi <i>(Cercospora apii)</i>	Chimico: • gli usuali interventi messi in atto per controllare la Septoriosi sono solitamente in grado di contenere anche questa malattia.		
Rizottoniosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	Fisico: • solarizzazione per ridurre la carica d'inoculo nel terreno. Agronomico: • effettuare un accurato drenaggio del terreno; • adottare ampi avvicendamenti culturali; • allontanare tempestivamente le piante malate.		
Sclerotinia <i>(Sclerotinia sclerotiorum, S. minor)</i>	Agronomico: • evitare gli eccessi di azoto; • alternare colture molto suscettibili ad altre poco recettive (cereali); • assicurare un buon arieggiamento nelle serre. Chimico: • in caso di accertata presenza.	• dicloran • <i>Coniothyrium minitans</i>	È ammesso al massimo 1 trattamento annuo per il controllo di questa avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Minatrice fogliare (<i>Philophylla heraclei</i>)	Chimico: • intervenire solo in caso di gravi infestazioni e sulle giovani piante trapiantate.	• triclorfon	Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.
Afide (<i>Cavariella aegopodi</i>)	Chimico: • solo in caso di forti infestazioni	• piretro • pirimicarb	
Limacce (<i>Limax</i> spp.)	Chimico: • ricorrere alle esche avvelenate alla loro comparsa.	• esche avvelenate a base di metaldeide	
Mosca minatrice (<i>Liriomyza</i> spp.)	Chimico: • se si riscontrano mine sotto epidermiche o punture di nutrizione e/o ovideposizione.	• ciromazina (2)	(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.

44 Difesa fitosanitaria integrata spinacio

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI CMV - virus del mosaico del cetriolo	Agronomico: ● scegliere varietà resistenti; Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: ● frangivento; ● siepi; ● reti antiafidiciche; ● pacciamatura.		(1) Al massimo 2 interventi annui (2) Al massimo 3 trattamenti indipendentemente dall'avversità.
CRITTOGAME Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i>)	Agronomico: ● impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; adottare ampie rotazioni; preferire cv resistenti; raccogliere e distruggere le piante infette. Chimico: ● intervenire al verificarsi di condizioni meteorologiche favorevoli (piogge abbondanti e ripetute e prolungata bagnatura fogliare).		● composti rameici ● propanocarb oxadixil (1) cimoxanil (2) ● dodina ditianon WG (granuli idrodispersibili)

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Antracosi (<i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>)	Agronomico: • risultano valide le stesse norme indicate per la Peronospora. Chimico: • alla comparsa dei sintomi.	• composti rameici	
FITOFAGI			
Afidì: Afide della fava (<i>Aphis fabae</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afidone verdastro del pisello (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	Afidi: Chimico: • in presenza di numerose colonie.	• estratto di piretto • eptenolos	Al massimo 2 trattamenti annui per il controllo di questi fitofagi.
Nottue fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Autographa gamma</i>)	Chimico: • in presenza di notevoli danni prodotti dalle larve.	• <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> ceppo 2348 fenitrotion (3) azadiracina etofenprox (3) indoxacarb	(3) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago.
Nematodi (<i>Ditylenchus dipsaci</i>)	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		

45

Difesa fitosanitaria integrata della barbabietola da zucchero

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI BNYVV - virus della rizomania	Agronomico: • scegliere cv tolleranti o resistenti; • effettuare lunghe rotazioni.		(1) Al massimo 2 interventi annui indipendentemente dall'avversità; questi prodotti controllano contemporaneamente anche le infezioni da Oidio. (2) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità.
CRITOGAME Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	Agronomico: • scegliere cv tolleranti.	Campionamento: osservare la presenza di macchie necrotiche su almeno 100 piante ad ettaro.	Chimico: • per le cultivar a buona tolleranza iniziare i trattamenti nel momento in cui si ha la confluenza delle macchie necrotiche sulle foglie in almeno il 40% delle piante; • per le cultivar a media tolleranza i trattamenti vanno iniziati alla comparsa delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie.
Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	Chimico: • in presenza di sintomi molto diffusi o di infezioni in forma epidemica.	• zolfo • procloraz (3) • nuarimol (3) • propiconazolo (3) • azoxystrobin (4)	(3) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi del fitton (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>R. violacea</i> , <i>Phoma betae</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• addottare avvicendamenti colturali (escludendo prati di leguminose);• effettuare un accurato drenaggio del terreno;• eseguire ordinarie lavorazioni;• razionalizzare l'irrigazione.		(5) Trattamenti localizzati alla semina usando 1 solo tra i prodotti indicati. L'uso di sementi conciate con imidacloprid è alternativo all'uso di geodisinfestanti. La concia dei semi con questo principio attivo è utile anche per il controllo di elateridi ed afidi. (6) Al massimo 1 trattamento all'anno con i piretroidi da utilizzare solo se non sono stati utilizzati i due metodi di controllo precedenti o in terreni ricchi di sostanza organica che disattiva i geodisinfestanti. (7)
FITOFAGI Altiche (<i>Chaetocnema tibialis</i> , <i>Longitarsus</i> spp., <i>Phyllotreta virutula</i>)	Chimico: soglia di intervento: <ul style="list-style-type: none">• fori sulle foglie cotiledonari;• 2 fori per foglia su piante con due foglie;• 4 fori per foglia su piante con 4 foglie.	<ul style="list-style-type: none">• benfuracarb (5)• carbosulfan (5)• uso di sementi conciate con imidacloprid (6)• ciflutrin (7)• bifentrin (7)• cipermetrina (7)• deltametrina (7)• lambda-cialotrina (7)• alfa-cipermetrina (7)	(8) Con i piretroidi al massimo 1 trattamento all'anno indipendente dall'avversità.
Punteruoli: Cleoni (<i>Conorhynchus mendicus</i> , <i>C. luigionii</i>) Liso (<i>Lixus juncii</i>)	Campionamento: a partire dalla comparsa delle prime foglioline, esaminare 100 piante/ha scelte a caso lungo i bordi dell'apezzamento. Chimico: soglia d'intervento: <ul style="list-style-type: none">• erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante esaminate;• intervenire contro gli adulti, al superamento della soglia d'intervento, effettuando dapprima un trattamento localizzato ai bordi dell'apezzamento e successivamente, se necessario a tutto campo prima dell'ovideposizione.	<ul style="list-style-type: none">• ciflutrin (8)• bifentrin (8)• cipermetrina (8)• deltametrina (8)• lambda-cialotrina (8)• alfametrina (8)• fluvalimate (8)• alfacipermetrina (8)	(8)

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare la monosuccessione; • evitare la coltura in successione al prato o alla medica per almeno due anni; • con infestazioni in atto, sarchiature ripetute. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soglia di intervento: 15 larve/m²; • alla semina impiegare un prodotto ad azione geodisinfestante. 	<ul style="list-style-type: none"> • geodisinfestanti a base di benfuracarb o carbosulfan (9) • fipronil (10) • imidacloprid (11) • teflutrin (12) 	<p>(9) Trattamenti localizzati alla semina.</p> <p>(10) Al massimo 1 trattamento annuo localizzato nei solchi usando semi non conciati con imidacloprid.</p> <p>(11) Al massimo 1 trattamento annuo ed esclusivamente come conciante delle sementi.</p> <p>(12) Al massimo 1 trattamento annuo localizzato nei solchi usando semi non conciati con imidacloprid.</p>
Afide della fava (<i>Aphis fabae</i>)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitare il trattamento alle aree infestate ed effettuarlo solo quando il 50% delle piante presenta colonie ed in assenza di antagonisti. 	<ul style="list-style-type: none"> • pirimicarb (13) 	<p>(13) Al massimo 1 trattamento annuo, ma solo in caso di insufficiente controllo biologico.</p>
Nottue terricole (<i>Agrotis segetum</i> ; <i>A. ipsilon</i>)	<p>Chimico: solo in colture con investimento non ottimale.</p> <p>Soglie d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino allo stadio di 8-10 foglie: 1 o 2 piante danneggiate per m²; • oppure 1 o 2 larve di terza o quarta età. 	<ul style="list-style-type: none"> • cipermetrina (14) • bifentrin (14) • ciflutrin (14) • lambda-cialotrina (14) • deltametrina (14) 	<p>(14) Al massimo 1 trattamento annuo con i piretroidi indipendentemente dal fitofago.</p>
Nematode a cisti (<i>Heterodera schachtii</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia o liliacee escludendo tassativamente le brassicacee; • integrare l'avvicendamento nei terreni molto infestati con colture intercalari di piante esca resistenti (15). 		<p>(15) Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo 40 giorni dalla semina per evitare la deiscenza dei semi e favorire un inerbimento dei terreni oppure vanno solo trinciate nel caso si voglia favorire un ricacco dei terreni a riposo (set aside).</p>

Difesa fitosanitaria integrata del pomodoro in pieno campo

AVVERSIÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare immediatamente le piante ammalate ed i residui infetti; • adottare adeguate rotazioni culturali. <p>Il controllo in campo di tali virusi, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frangivento; • siepi; • reti antiafidicide; • pacciamatura. 		<p>(1) Solo sulle piante colpite. Sospendere i trattamenti con temperature superiori a 27°C. (2) A distanza di almeno 15 gg. dal trapianto.</p>
BATTERIOSI	<p>Maculatura batterica (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)</p> <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare immediatamente le piante ammalate ed i residui infetti; • adottare adeguate rotazioni culturali. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza della sintomatologia. • composti rameici (1) • acibenzolar-S-methyl (2) 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cancro batterico <i>(Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>) Batteriosi del fusto <i>(Pseudomonas corrugata)</i>	Agronomico: • estirpare e bruciare le piante che manifestano sintomi.		
CRITTOGAME Peronospora <i>(Phytophthora infestans)</i>	Agronomico: • utilizzare varietà tolleranti; • evitare l'irrigazione a pioggia. Chimico: • in caso di umidità relativa elevata e temperature inferiori ai 25°C.	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici (3) • dodina • fosetyl-alluminio (4) • benalaxil (4) • oxadixil (4) • metalaxil (4) • propanocarb (4) • dimetomorf (5) • cimoxanil (6) • azoxystrobin (7) • ditianon WG (granuli idrodispersibili) • famoxadone + cimoxanil (8) • iprovalicarb (6) 	<p>(3) Solo sulle piante colpite. Sospendere i trattamenti con temperature superiori a 27°C.</p> <p>(4) Al massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità, anche in miscela con rame.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(6) Al massimo 3 trattamenti indipendentemente dall'avversità, anche in miscela con rame.</p> <p>(7) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità ed in alternativa alla miscela contenente famoxadone.</p> <p>(8) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità ed in alternativa all'azoxystrobin.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cladosporiosi <i>(Cladosporium fulvum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> adottare ampie rotazioni culturali; evitare le irrigazioni a pioggia ed i ristagni idrici. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in presenza di sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici azoxystrobin (9) 	In genere è controllata dai trattamenti antiperonosporici. (9) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità.
Alternariosi <i>(Alternaria spp.)</i> Septoriosi <i>(Septoria lycopersici)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> adottare ampie rotazioni culturali; evitare le irrigazioni a pioggia ed i ristagni idrici. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in presenza di gravi infezioni. 	<ul style="list-style-type: none"> composti rameici diclofluanide azoxystrobin (10) 	(10) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheomicosi (<i>Verticillium</i> spp, <i>Fusarium oxysporum</i> ff. sspp.)	Agronomico: • adottare rotazioni con piante non suscettibili; • scegliere varietà resistenti; • estirpare e distruggere le piante infette.		
Radice suberosa (<i>Pyrenopeziza hyopersici</i>)	Agronomico: • scegliere cultivar resistenti; • effettuare la rincalzatura delle piante; • effettuare irrigazioni localizzate (manichetta forata); • estirpare e distruggere le piante ammalate.		
FITOFAGI	<p>Afidi: Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)</p> <p>Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)</p> <p>Afide della fava (<i>Aphis fabae</i>)</p> <p>Afide delle malvacee (<i>Aphis gossypii</i>)</p> <p>Afide della patata (<i>Aulacorthum solani</i>)</p>	<p>Campionamento: valutare la presenza - assenza di colonie di afidi su almeno 50 piante scelte a caso lungo un percorso, anch'esso a caso, nel campo.</p> <p>Chimico: Soglie d'intervento: • nel periodo estivo - autunnale, per gli afidi neri (<i>Aphis</i> spp.) = più del 50% di piante infestate; • per gli altri afidi = più del 10% di piante infestate; • nel periodo primaverile e per specie vettive di virosi la soglia si abbassa alla sola presenza.</p>	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (11) Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dal fitofago. (12) Al massimo 1 trattamento all'anno su culture gravemente infestate l'anno precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • piretro • oli minerali • pirimicarb (11) • imidacloprid (12) • pymetrozine (11)

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum;</i> <i>Bemisia tabaci)</i>	Campionamento: esaminare una foglia basale su 10 piante su 100 mq di superficie. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• soglia di intervento = 10 neanidi/cmq/foglia.	• buprofezin • Beauveria bassiana • pymetrozina	Al massimo 1 trattamento all'anno contro questo fitofago.
Minatori fogliari <i>(Liriomyza trifolii;</i> <i>L. bryoniae; L. huidobrensis)</i>	Campionamento: esaminare 100 foglie/ha scelte a caso. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• soglia di intervento= 2 mine/foglia.	• ciromazina • esaflumuron (13)	Al massimo 1 trattamento all'anno contro questo fitofago. (13) Al massimo 2 trattamenti complessivi sulla coltura a prescindere dal fitofago.
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	Campionamento: esaminare una foglia nella parte medio bassa di 100 piante/ha. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• soglia di intervento= 50% di foglie con presenza di ragnetto rosso e con meno del 20% di esse con Fitoseidi.	• exitiazox (14) • clofentezine (14) • fenazaquin (14) • abamectina (14) • feniproximate (14) • tebufenpirad • Beauveria bassiana	(14) Al massimo 1 trattamento all'anno indipendentemente dal fitofago.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue terricole <i>(Agrotis ipsilon, A. segetum)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• in caso di erosioni fogliari, esaminare la superficie inferiore delle foglie per rilevare la presenza di ovature o larvette;• in caso di piantine troncate al colletto si esaminano gli strati superficiali del suolo, ai piedi di due tre piantine ogni 20-30 m del percorso;• intervenire in presenza di larve.	<ul style="list-style-type: none">• esche avvelenate a base di metiocarb• ciflutrin (15) (16)• alfametrina (15) (16)• teflutrin (15) (16)• zeta-cipermetrina (15) (16)• deltametrina (16)• lambda-cialotrina (16)• alfa-cipermetrina (16)• bifentrin (16)	(15) Autorizzato esclusivamente in presenza di larve neonate, con trattamenti localizzati. (16) Al massimo 1 trattamento all'anno con i piretroidi indipendentemente dal fitofago e dal p.a. utilizzato.
Nottue fogliari <i>(Heliothis armigera)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• intervenire in presenza di forti infestazioni;• intervenire in presenza di forti infestazioni, alla comparsa delle prime larve.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Bacillus thuringiensis</i> (ceppo EG 2348)• esaflumuron (17)• indoxacarb• azadiractina	(17) Al massimo 2 trattamenti annuali indipendentemente dall'avversità.
Tripidi <i>(Frankliniella occidentalis)</i> Cimici verdi <i>(Nezara viridula)</i>	Chimico: <ul style="list-style-type: none">• in caso di presenza diffusa e significativa.	<ul style="list-style-type: none">• piretro naturale lufenuron (18)• acrinatrina (E-FLO) (19)• <i>Beattneria bassiana</i> (20)	(18) Al massimo 2 trattamenti annuali indipendentemente dal fitofago, solo per il controllo dei tripidi. (19) Con piretroidi al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago, solo per il controllo dei cimici. (20) Autorizzato solo per i tripidi.
Nematodi <i>(Meloiodyne incognita)</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">• utilizzare varietà resistenti (Nemador, Trajan);• effettuare ampie rotazioni.		

Difesa fitosanitaria integrata del tabacco

SELENZAIO	AVVERTITÀ DA CONTROLLARE VIROSI	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
	CMV - virus del mosaico del cetriolo TMV - virus del mosaico del tabacco TNV - virus della necrosi del tabacco	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: • frangivento; • siepi; • reti antiaffidiche; • pacciamatura.		(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e in miscela con prodotti di copertura. (2) Al massimo 3 trattamenti annui con questo p.a.
	Marciumi radicali (<i>Pythium</i> spp., <i>Thielaviopsis basicola</i> , <i>Olpodium brassicae</i> , <i>Alternaria tabacina</i>) Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	Chimico: • fare in modo che l'ultimo trattamento capiti uno o due giorni prima del trapianto, in modo da garantire anche una protezione delle piantine in campo nei primi giorni dopo l'attaccamento.	• composti rameici • mancozeb • metiram • metalaxil (1) • benalaxil (1) • cimoxanil (2)	(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e in miscela con prodotti di copertura. (2) Al massimo 3 trattamenti annui con questo p.a.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE FITOFAGI	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi: Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide delle malvacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide della patata (<i>Aulacorthum solani</i>)	Chimico: • alla comparsa delle prime colonie.	pirimicarb azadiractina • • • pymetrozine (3)	(3) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.

PIENO CAMPO

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI CMV - virus del mosaico del cetriolo TMV - virus del mosaico del tabacco TNV - virus della necrosi del tabacco	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, • eliminare dal campo le piantine malate; • eliminare i residui infetti; • effettuare rotazioni colturali adeguate. Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV, deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a: • frangivento; • siepi; • reti antiafidie; • paciamatura.		
BATTERIOSI Maculature e necrosi fogliari (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i>) Avvizzimento (<i>Pseudomonas solanacearum</i>) Marciume molle del fusto (<i>Erwinia carotovora</i> sub sp. <i>carotovora</i>)	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminazione dal campo delle piantine malate e dei residui infetti; • opportune rotazioni colturali. Chimico: • in presenza di condizioni meteorologiche predisponenti.		• acibenzolar-S-metil + metalaxil M

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere cv resistenti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di condizioni meteorologiche predisponenti eseguire interventi con finalità preventiva, usando prodotti di copertura in miscela a prodotti sistemicici; • alla comparsa dei primi sintomi, intervenire usando solo prodotti citotropici o sistemici con finalità curativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • cinoxanil (4) • mancozeb (5) • benalaxil (6) • metalaxil (6) • metalaxil M+mancozeb • fosetyl Al+cinoxanil +mancozeb (4) 	<p>(4) Al massimo tre trattamenti annui con questo p.a.</p> <p>(5) Da usare in miscela con fenilammidici.</p> <p>(6) Effettuare due interventi annui con fenilammidi.</p>
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare opportuni sistemi di impianto; • eliminare le erbe infestanti ed i residui della coltura precedente; • sbranciolatura. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo 	
Marciumi radicali (<i>Pythium</i> spp., <i>Thielaviopsis basicola</i> , <i>Olpidium brassicae</i> , <i>Alternaria tabacina</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare i fattori che determinano l'eziolatura dei tessuti (eccessi di N, semine fritte); • effettuare rotazioni di almeno 3-4 anni; • effettuare la correzione del pH del terreno; • effettuare l'eradicazione e la bruciatura delle piante malate. 		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheomicosi <i>(Fusarium spp. e Verticillium spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare dal campo le piantine malate; • adottare opportune rotazioni culturali. 		
FITOFAGI Pulce <i>(Epithrix hirtipennis)</i>	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei primi danni o in presenza di 4 adulti/pianta (0,5-1 adulto/pianta per le varietà Kentucky) previo controllo di almeno 100 piante/ha scelte a caso. 	<p>(7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • imidacloprid (7) • ciproféntrin (7) • bifentrin (7) • deltametrina (7) • lambda-cialotrina (7) 	<p>Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago da controllare.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Afidi Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide delle malvacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide della patata (<i>Aulacorthum solani</i>)	Chimico: • in presenza di forti infestazioni o di focolai di virosi.	pirimicarb imidacloprid (8) azadiractina pymetrozine (8)	(8) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago da controllare.
Nottue (<i>Agrotis</i> spp) Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	Chimico: • utilizzare delle piante “esca” per il rilevamento delle prime infestazioni; • intervenire se viene evidenziata la presenza di larve nel terreno con piante esca; • effettuare trattamenti localizzati.	clorpirifos (9) teflutrin (10) carbosulfan (11) banfuracarb (12)	(9) Ammesso 1 solo trattamento contro questi fitofagi. Al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità ed esclusivamente con formulazioni granulari per trattamenti al terreno. (10) Autorizzato solo per il controllo degli elateridi. Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità e da usare esclusivamente in maniera localizzata alla semina. (11) Al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità e localizzato sulla fila al momento del trapianto. (12) Autorizzato solo per il controllo degli elateridi. Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.
Nematodi	Agronomico <input checked="" type="checkbox"/> • adottare specie resistenti ed ampie rotazioni.		

FITOREGOLATORI

E' ammesso l'uso dei seguenti prodotti ad azione antigermogilante per la scacchiatura chimica:

- Idrazone maleica
- Alcoli grassi
- Pendimetalin

(da non impiegarsi su tabacco da seme)

48

Difesa fitosanitaria integrata dei cereali minori (orzo, avena e segale)

AVVEROSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
BYDV - virus del nanismo giallo dell'orzo	Agronomico: • scegliere varietà resistenti; • effettuare semine ritardate; • evitare il ristoppio.		
CRITTOGAME			
Carbone (<i>Ustilago</i> spp.)	Chimico: • conciare il seme.	• carbossina + tiram • triticonazolo + iprodione	
Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>) Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.)	Agronomico: • scegliere varietà resistenti; • effettuare concimazioni equilibrate; • evitare le semine troppo fitte.		
Elmintosporiosi (<i>Drechslera</i> spp.)	Agronomico: • evitare il ristoppio; Chimico: • conciare il seme.	• carbossina + tiram • fludioxonil (1) • triticonazolo + iprodione	(1) Registrato solo su Orzo.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal del piede (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare ampie rotazioni; • evitare il ristoppio; • bruciare le stoppie nei terreni dove si sono verificati attacchi; • evitare i ristagni idrici con opportune sistemazioni del terreno; • ricorrere ad idonee densità di semina; • scegliere cv resistenti all'allettamento; • equilibrare le concimazioni azotate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conciare i semi. 		(2) Registrato solo su orzo.
FITOFAGI	<p>Afidi:</p> <p>Afide verde scuro delle drupacee (<i>Rhopalosiphum padi</i>)</p> <p>Afide verde della rosa (<i>Metopolophium dirhodum</i>)</p> <p>Afidone delle graminacee (<i>Sitobion avenae</i>)</p>		

Difesa fitosanitaria integrata del frumento (tenero e duro)

AVVERTITA DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME			
Carbone <i>(Ustilago tritici)</i> Carie <i>(Tilletia spp.)</i>	Chimico: • concia dei semi.	carbossina + tiram tebuconazolo + tiram fludioxonil triticonazolo + iprodione tebuconazolo+imazalil	
Fusariosi <i>(Fusarium spp)</i>	Agronomico: • limitare le concimazioni azotate; • evitare semine troppo fitte. Chimico: • concia dei semi.	tebuconazolo + tiram prochloraz + mancozeb fludioxonil triticonazolo + iprodione	
Nerume <i>(Alternaria spp., Cladosporium herbarum, Epicoccum nigrum)</i>	Agronomico: • adottare un'opportuna densità di semina; • effettuare equilibrate concimazioni.		
Oidio <i>(Erysiphe graminis)</i>	Agronomico: • scegliere varietà resistenti e tolleranti; • limitare le concimazioni azotate; • evitare semine troppo fitte.		

AVVERTITA DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ruggini (<i>Puccinia graminis</i> , <i>P. recondita</i> e <i>P. striiformis</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • scegliere cv resistenti e precoci; • limitare le concimazioni azotate; • evitare semine troppo fitte. 		
Septoriosi (<i>Septoria nodorum</i> , <i>S. tritici</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare avvicendamenti; • scegliere cv resistenti; • limitare le concimazioni azotate; • evitare semine troppo fitte. Chimico <ul style="list-style-type: none"> • conciare i semi. 	<ul style="list-style-type: none"> • fludioxonil • triticonazolo + iprodione 	(1) Al massimo 1 intervento all'anno con 0,5 kg/ha di p.a.
FITOFAGI			
Afidi: Afide verde scuro delle drupacee (<i>Rhopalosiphum padi</i>) Afide verde della rosa (<i>Metopolophium dirhodum</i>) Afidone delle graminacee (<i>Sitobion avenae</i>)	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • evitare semine troppo fitte; • limitare le concimazioni azotate. Campionamento: controllare 200 spighe/ha dalla spighatura fino all'inizio della maturazione lattea. Chimico: Soglie d'intervento: 60% di infestazione.	(1) Al massimo 1 intervento all'anno con 0,5 kg/ha di p.a.	
Nematodi <i>Pratylenchus thornei</i>	Agronomico: <ul style="list-style-type: none"> • effettuare avvicendamenti. 		

50 Difesa fitosanitaria integrata del mais

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
MDMV - virus del nanismo maculato del mais BYDV - virus del nanismo giallo dell'orzo	Agronomico: • eliminare le sorgenti di infezione sia all'interno che in prossimità della coltura.		
CRITTOGAME			
Carbone comune (<i>Ustilago maydis</i>)	Agronomico: • effettuare concimazioni equilibrate; • adottare ampie rotazioni; • raccogliere e distruggere i giovani tumori prima che lascino fuoriuscire le spore.		
Marciume del fusto (<i>Gibberella zae</i>)	Agronomico: • limitare le concimazioni azotate; • evitare gli squilibri idrici ; • evitare le semine troppo fitte; • utilizzare ibridi resistenti o tolleranti.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE FITOFAGI	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare la coltura in successione a prati stabili per almeno 2 anni; • in caso di successione a mediciai è opportuno rompere il prato nell'estate precedente la semina, in modo che le larve subiscano l'azione negativa del caldo estivo; • effettuare sarchiature ripetute. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soglia di intervento=15 larve/mq, accertata mediante carotaggi del terreno in pre-semina. 		(1) Al massimo 1 trattamento annuo da eseguire localizzato nei solchi alla semina se non si usano sementi conciate con imidacloprid. (2) Solo per la concia dei semi.
Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricorrere alla sfibratura degli stocchi a fine coltura; • tempestiva aratura. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa degli adulti. 	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • var. <i>kurstaki</i> 	
Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	<p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza di attacchi diffusi che possono compromettere l'investimento. 	<p>ciflutrin (3)</p> <p>deltametrina (3)</p> <p>lambda-cialotrina (3)</p> <p>alfa-cipermetrina (3)</p>	(3) Al massimo 1 trattamento annuo con piretroidi a prescindere dal fitofago.

Difesa fitosanitaria integrata del girasole

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE CRITOGAME	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Peronospora <i>(Plasmopara helianthi)</i>	Agronomico: • adottare varietà resistenti; Chimico: • effettuare la concia delle sementi.	• metalaxil • benalaxil	
Marciume carbonioso <i>(Sclerotium bataticola)</i>	Agronomico: • effettuare lunghe rotazioni; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eseguire semine precoci; • adottare ridotta densità di semina; • limitare le concimazioni azotate; • effettuare irrigazioni di soccorso.		
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	Agronomico: • effettuare l'interramento dei residui culturali infetti; • limitare le concimazioni azotate.		
Sclerotinia <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i>	Agronomico: • effettuare lunghe rotazioni; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • interrare i residui culturali infetti; • effettuare concimazioni equilibrate; • effettuare un accurato drenaggio.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rizottinosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pre-impianto trattare il terreno con il vapore o con la solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare lunghe rotazioni; • assicurare un accurato drenaggio; • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • effettuare trapianti superficiali; • eliminare i residui della vegetazione precedente; • assicurare una buona areazione della serra; • distruggere le piante infette ai primi sintomi; • adottare opportune distanze di impianto. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti all'apparato radicale. 	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p>	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume basale <i>(Phytophthora cryptogea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere cloni poco suscettibili; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare i ristagni idrici; • controllare la temperatura nella serra; • distruggere immediatamente le piante colpite. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfeccare i substrati di coltivazione con vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di sintomi. 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(3) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità e dal p.a. impiegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • propamocarb • benalaxil (3) • metalaxil (3) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheoverticilliosi <i>(Verticillium dahliae)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfeccare i substrati di coltivazione con il vapore o con la solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • ricorrere a varietà poco suscettibili; • effettuare lavorazioni accurate, per evitare lesioni alle radici; • distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subito dopo il trapianto trattare l'apparato radicale. 	<p>(4) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.</p>	<p>(4) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ruggine bianca <i>(Puccinia horiana)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • scegliere varietà poco suscettibili; • assicurare un'adeguata regolazione dei parametri climatici della serra. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire ai primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • ossicarbossina • bitertanolo (5) • penconazolo (5) 	(5) I fungicidi del gruppo IBE vanno utilizzati per non più di 2 volte, indipendentemente dall'avversità.
Oidio <i>(Oidium chrysanthemi</i> <i>O. tabaci</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccogliere e distruggere le foglie colpite; • dosare opportunamente le concimazioni azotate e le irrigazioni; • ricorrere a cv poco suscettibili. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire ai primi sintomi. • in caso di gravi attacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo • bitertanolo (6) • esaconazolo (6) • penconazolo (6) 	(6) I fungicidi del gruppo IBE vanno utilizzati per non più di 2 volte, indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE FITOFAGI	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza delle prime forme mobili effettuare lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> (4 individui/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di infestazioni non controllate con gli ausiliari, preferibilmente in maniera localizzata, distanziando i trattamenti di almeno 7-10 gg. dai lanci. 	<p>• <i>Phytoseiulus persimilis</i></p> <p>• clofentezine o exitiazox, in miscela con oli minerali (7) flucloxiuron benzossimato bromopropilato feniproximate (8) tebufenpirad fenazaquin (9) abamectina (9) <i>Beauveria bassiana</i></p>	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questo fitofago. (7) Controllare preventivamente l'eventuale fitotossicità su poche piante. (8) Da non impiegare in serra. (9) Questi 2 p.a. vanno impiegati in alternativa tra loro.</p>
Minatrice fogliare <i>(Liriomyza trifolii)</i>	<p>Installare le trappole cromotropiche gialle.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prime catture con le trappole ed all'individuazione delle prime mine effettuare lanci di <i>Diglyphus isaea</i> (1 individuo/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di infestazioni non controllate con gli ausiliari, preferibilmente in maniera localizzata, distanziando i trattamenti di almeno 7-10 gg. dai lanci. 	<p>• <i>Diglyphus isaea</i></p>	<p>(10) Al massimo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>• ciromazina (10) • esaflumuron</p> <p>• Al massimo 1 trattamento annuo</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi <i>(Thrips tabaci, H. haemorrhoidalis, Frankliniella occidentalis)</i>	<p>Installare le trappole cromotropiche azzurre.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuare abbondanti lavaggi; alle prime catture con le trappole effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i> o di <i>O. majusculus</i> (1-2/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di focolai non controllati dagli ausiliari, preferibilmente in maniera localizzata, distanziando i trattamenti di almeno 7-10 gg. dai lanci. 	<p>• <i>Orius laevigatus</i></p> <p>• <i>O. majusculus</i></p> <p>• piretro naturale</p> <p>• flufenoxuron (11)</p> <p>• etofenprox (12) in miscela con oli minerali</p> <p>• acrinatrina (E-FLO) (14)</p> <p>• lufenuron</p> <p>• azadiractina</p> <p>• <i>Beauveria bassiana</i></p>	<p>(11) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(12) Effettuare al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(13) Controllare preventivamente l'eventuale fitotossicità su poche piante.</p> <p>(14) Con i piretroidi al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)</i>	<p>Installare le trappole cromotropiche gialle nella serra.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle prime catture con le trappole effettuare i lanci di <i>Macrolophus caliginosus</i> (1 per mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in caso di elevate infestazioni, preferibilmente in maniera localizzata, distanziando i trattamenti di almeno 7-10 gg. dai lanci. 	<p>• <i>Macrolophus caliginosus</i></p> <p>• buprofezin</p> <p>• flufenoxuron (15)</p> <p>• etofenprox (16)</p> <p>• azadiractina</p> <p>• <i>Beauveria bassiana</i></p> <p>• pymetrozine (15)</p>	<p>(15) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(16) Effettuare al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ceroplaste (<i>Ceroplastes sinensis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> evitare un eccessivo lussureggianto ed ombreggiamento delle piante; regolare l'umidità e la temperatura delle serre. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in caso di gravi infestazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> oli minerali (17) buprofezin 	(17) Controllare la fitotossicità su poche piante.
Afidi: Afide delle malvacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide dell'accartocciamento delle foglie del susino (<i>Brachycaudus helichrysi</i>) Afide bruno del crisantemo (<i>Macrosiphonella sanborni</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla comparsa delle prime colonie effettuare: <ol style="list-style-type: none"> lanci di <i>Aphidius colemani</i> (1individuo/mq), se prevale il <i>Myzus persicae</i>; lanci di <i>Lysiphlebus testaceipes</i> (1individuo/mq), se prevale l'<i>Aphis gossypii</i>; lanci di <i>Chrysoperla carnea</i> (5 individui/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in caso di forti pullulazioni non controllabili con gli ausiliari. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Aphidius colemani</i> <i>Lysiphlebus testaceipes</i> <i>Chrysoperla carnea</i> <ul style="list-style-type: none"> piretro naturale pirimicarb imidacloprid (18) azadiractina pymetrozine (18) 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. (18) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tortrici <i>(Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere le piante infette ed i residui culturali; • eliminare le piante spontanee. <p>Installare le trappole chemiotropiche all'inizio del ciclo culturale.</p> <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre le trappole luminose per la cattura massale degli adulti nelle fasi iniziali del ciclo culturale. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alle prime ovideposizioni, subito dopo il picco di catture con le trappole, con il <i>B. thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>; • intervenire alle prime ovideposizioni con gli IGR. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> • diflubenzuron (19) • esaflumuron • triflumuron 	(19) Autorizzato solo su colture in pieno campo.

53

Difesa fitosanitaria integrata del garofano

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FISIOPATIE			
Calice scopione	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">evitare le brusche variazioni di temperatura, soprattutto in fase di formazione del fiore, mediante idoneo riscaldamento della serra.		
VIROSI			
CarMV - Virus del mosaico del garofano	Agronomico: <ul style="list-style-type: none">impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Rizottiosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare lunghe rotazioni; • eseguire un accurato drenaggio; • effettuare concimazioni equilibrate; • distruggere le piante colpite; • trapiantare superficialmente; • circondare l'apparato radicale delle barbatelle con torba; • disinfezione il terreno con vapore; • effettuare la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la disinfezione del terreno; • in pre-trapianto disinfezione delle barbatelle (1); • dopo il trapianto alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • tiabendazolo (2) • benomil (3) • carbendazim (3) • tiofanato-metile (3) • tolclofos-metile (4) • iprodione (4) 	<p>(1) In pre-trapianto si può eseguire la concia a secco o la concia umida mediante immersione delle barbatelle in una sospensione disinfettante.</p> <p>(2) Da utilizzarsi solo per la disinfezione del terreno; al massimo 2 trattamenti annuali indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Al massimo 2 trattamenti annuali indipendentemente dall'avversità e dal momento d'impiego, scegliendo tra questi tre principi attivi. 1 trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p> <p>(4) Al massimo 1 trattamento annuale indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ruggine <i>(Uromyces caryophyllinus)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare riscaldamento e ventilazione delle serre adeguati; • adottare cultivar mediterranee in zone molto umide. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • ossicarbossina • ditianon • biteranol (5) • miclobutanil (5) • penconazolo (5) • difenoconazolo (5) • composti rameici 	(5) I fungicidi del gruppo IBE vanno utilizzati in miscela con prodotti di copertura e per non più di 2 trattamenti annui, a prescindere dall'avversità e dal principio attivo.
Alternariosi <i>(Alternaria dianthii)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare la condensa di vapore acqueo e ridurre l'umidità ambientale; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • iprodione • dodina 	Ammesso 1 solo trattamento con uno qualsiasi dei prodotti indicati.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Fusariosi <i>(Fusarium oxysporum f.sp. dianthii)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • impiegare cultivar meno suscettibili; • coltivazione su bancali sopraelevati; • disinfezione del terreno con il vapore; • solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione delle barbatelle in pre-trapianto; • trattamenti a partire da 30 gg. dal trapianto. 	<ul style="list-style-type: none"> (6) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le culture in pieno campo. • benomil (6) • carbendazim (6) • tiofanato-metile (6) 	<p>(6) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le culture in pieno campo.</p> <p>(7) Al massimo 1 trattamento annuo per il controllo di questo patogeno scegliendo tra questi 4 principi attivi.</p>
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare una buona aerazione della serra; • evitare le irrigazioni a pioggia. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in pre-fioritura. 	<ul style="list-style-type: none"> (7) Al massimo 1 trattamento annuo per il controllo di questo patogeno scegliendo tra questi 4 principi attivi. • iprodione (7) • procimidone (7) • clozolinate (7) • fludioxonil + cyprodinil (7) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume basale <i>(Phytophthora cryptogea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere cloni poco suscettibili; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare i ristagni idrici; • controllare le temperature nella serra; • distruggere immediatamente le piante colpite alla presenza dell'attacco. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezare i substrati di coltivazione con vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire subito dopo il trapianto. 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(8) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(9) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.</p>	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(8) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(9) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE FITOFAGI	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più lanci di ausiliari: <i>Phytoseiulus persimilis</i> (4 ind./mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai primi focolai, intervenendo in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<p>• Acari fitoseidi</p> <p>• clofentezine exitiazox flucicloxuron benzossimato bromopropilato feniproximate (10) tebufenpirad fenazaquin (11) abamectina (11)</p> <p>• <i>Beauveria bassiana</i></p>	<p>Effettuare al massimo dal prodotto 1 trattamento fitosanitario</p> <p>(10) Non consentito in serra. (11) Questi 2 p.a. vanno impiegati in alternativa tra loro</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>T. atratus</i> , <i>Haeliothrips haemorrhoidalis</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui colturali; • eliminare le infestanti; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. <p>Installare trappole cromotropiche di colore azzurro.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alle prime catture con uno o più lanci degli ausiliari: <i>Orius</i> spp., (per la <i>F. occidentalis</i>), ecc. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<p>Rincoti autocordi</p> <ul style="list-style-type: none"> • piretro • etofenprox in miscela con oli minerali (12) • flufenoxuron (13) • lufenuron • acrinatrina (E-FLO) (13) • azadiractina • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>(12) Ricorrere a questa soluzione solo in caso di gravi infestazioni. Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal parassita controllato.</p> <p>(13) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bega o Tortrice mediterranea del garofano <i>(Cacoecimorpha pronubana)</i> Bega Sudafricana del garofano <i>(Epichoristodes acerbella)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apportare e distruggere le parti infestate; • eliminare i residui culturali; • eliminare le erbe infestanti; • utilizzare reti antinsetto. <p>Installare trappole a feromoni.</p> <p>Campionamento: esaminare germogli/1000mq di coltura.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire dopo il picco di volo, al superamento della soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati. 	<p>settimanalmente 200</p> <ul style="list-style-type: none"> • esaflumuron • triflumuron 	
Nematodi <i>(Meloia dygme incognita,</i> <i>Heterodera dayerti)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del terreno con vapore; • rotazioni culturali. 		

Difesa fitosanitaria integrata della gerbera

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Marciume basale (<i>Phytophthora cryptogea</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere cloni poco suscettibili; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • eliminare i ristagni idrici; • controllare le temperature nella serra; • distruggere immediatamente le piante colpite alla presenza dell'attacco. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfeccare i substrati di coltivazione con vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire subito dopo il trapianto. 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(1) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.</p>	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(1) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciume del colletto <i>(Rhizoctonia solani)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pre-impianto disinfezione il terreno con vapore o con la solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • come per il marciume basale. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti all'apparato radicale; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<p></p> <p></p> <p></p>	<p>(3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p> <p>• benomil (3) carbendazim (3) tiofanato-metile (3)</p> <p>• tolclofos-metile (4) iprodone (4)</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheoverticilliosi <i>(Verticillium dahliae e V. alboatum)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione il terreno con vapore o con la solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • impiegare a varietà resistenti; • distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti all'apparato radicale. 		(5) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità, scegliendo tra questi tre principi attivi.
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare una buona aerazione della serra; • evitare le irrigazioni a pioggia. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in pre-fioritura. 	<ul style="list-style-type: none"> • benomil (5) • carbendazim (5) • tiofanato-metile (5) 	(6) Al massimo 1 trattamento annuo per il controllo di questa avversità scegliendo tra questi quattro principi attivi.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal Bianco <i>(Erysiphe cichoracearum)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arreggiare razionalmente la serra; • regolare opportunamente i parametri climatici. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire ai primi sintomi; • intervenire in caso di gravi attacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo • bitertanolo (7) • esaconazolo (7) • penconazolo (7) 	(7) Al massimo 2 trattamenti annui con gli IBE indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE FITOFAGI	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza delle prime forme mobili effettuare lanci di <i>Phytoseiulus persimilis</i> (4 individui/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<p>• <i>Phytoseiulus persimilis</i></p> <p>• clofentezine exitiazox benzossimato bromopropilato tebufenpirad feniproximate (8) fenazaquin (9) abamectina (9) oli minerali (10) <i>Beauveria bassiana</i></p>	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questo fitofago. (8) Esclusivamente in pieno campo. (9) Questi 2 p.a. vanno impiegati in alternativa tra loro (10) Verificare preventivamente la fitotossicità su poche piante.</p>
Minatrice fogliare <i>(Liriomyza trifolii)</i>	<p>Installare trappole cromotropiche gialle.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle prime catture con le trappole cromotropiche gialle e all'individuazione delle prime mine effettuare lanci di <i>Diglyphus isaea</i> (1 individuo/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<p>• <i>Diglyphus isaea</i></p> <p>• ciromazina (11) esaflumuron</p>	<p>(11) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi <i>(Thrips tabaci, H. haemorrhoidalis, Frankliniella occidentalis)</i>	<p>Installare trappole cromotropiche azzurre. Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> assicurare un abbondante lavaggio; alle prime catture con le trappole effettuare lanci di <i>Orius laevigatus</i> ed <i>O. majusculus</i> (1-2 individui/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orius laevigatus</i> • <i>Orius majusculus</i> 	<p>(12) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(13) Verificare preventivamente la fitotossicità su poche piante.</p> <p>(14) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)</i>	<p>Installare trappole cromotropiche gialle. Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle prime catture con le trappole effettuare lanci di <i>Encarsia formosa</i> o <i>E. pergandiella</i> (5-6ind./mq) <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • piretro naturale • etofenprox (12) in miscela con oli minerali (13) • flufenoxuron (14) • acrinatrina (E-FLO) (14) • lufenuron • <i>Beauveria bassiana</i> • azadiractina 	<p>(15) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(16) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tortrici <i>(Cacoecimorpha pronubana; Epichoristodes acerbella)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui culturali e le piante infette ai primi attacchi; • eliminare le piante spontanee. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre le trappole luminose all'inizio del ciclo culturale. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installare ad inizio ciclo culturale le trappole a feromone; • intervenire subito dopo il picco di catture. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus thuringiensis</i> • esaflumuron • triflumuron • diflubenzuron (17) 	(17) Autorizzato solo su colture in pieno campo.

55

Difesa fitosanitaria integrata del gladio

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rizottinosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare ampie rotazioni; • realizzare un accurato drenaggio; • distruggere i residui culturali; • effettuare concimazioni equilibrate; • aerare gli ambienti in serra; • eseguire trapianti superficiali; • distruggere le piante infette. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinsettare il terreno con vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concia dei bulbi; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p>	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal dello sclerozio (<i>Sclerotinia gladioli</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare ristagni di umidità; • controllare l'umidità nella serra; • distruggere le piante affette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei bulbi; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • benomil (3) • carbendazim (3) • dicloran • procimidone (4) • <i>Coniothyrium minitans</i> 	<p>(3) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p> <p>(4) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre la concia, indipendentemente dall'avversità.</p>
Marciumi del bulbo (<i>Botrytis gladiolorum</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium gladioli</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare lesioni ai bulbi; • conservare i bulbi in locali ventilati; • controllare i valori di umidità e temperatura dei locali di conservazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei bulbi; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • benomil (5) • carbendazim (5) • tiofanato-metile (5) • fludioxonil + cyprodinil (5) • procimidone (6) • dicloran • fludioxonil (7) 	<p>Al massimo 3 trattamenti annui, oltre alla concia, per questa avversità, a prescindere dai principi attivi utilizzati.</p> <p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p> <p>(6) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre la concia, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(7) Da utilizzarsi solo per la concia dei bulbi.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tracheofusariosi <i>(Fusarium oxysporum f.sp. gladioli)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • utilizzare cv meno suscettibili (Ballerina, Withe Prosperity, Fond Memory); • eliminazione piante affette. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del terreno con vapore o solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei bulbi; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<p>(8) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p>	<p>(8) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p>
Maculature fogliari <i>(Heterosporium gracile, Septoria gladioli, Curvularia trifolii f. sp. gladioli)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione ristagni di umidità; • concimazioni ed irrigazioni equilibrate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei sintomi. • composti rameici 		

AVVERTITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> uno o più lanci di ausiliari: <i>Phytoseiulus persimilis</i> (4 ind/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> clofentezine exitiazox benzossimato bromopropilato feniproximate (9) tebufenpirad fenazaquin • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 1 trattamento annuo con uno dei prodotti indicati e solo se il controllo biologico risulta insufficiente.</p> <p>(9) Esclusivamente in pieno campo.</p> <p>(10) Da utilizzarsi solo in caso di gravi infestazioni e per 1 solo trattamento annuo.</p> <p>(11) Al massimo 1 trattamento annuo con questi p.a., indipendentemente dal fitofago.</p>
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Haematothrips haemorrhoidalis</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> distruzione dei residui culturali; eliminazione delle infestanti. <p>Installare trappole cromotropiche di colore azzurro.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle prime catture intervenire con uno o più lanci degli ausiliari: <i>Orius</i> spp. (per la <i>F. occidentalis</i>), ecc. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rincoti antocoridi <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> piretto naturale fosalone (10) flufenoxuron (11) acrinatrina (E-FLO) (11) lufenuron • <i>Beauveria bassiana</i> azadiractina 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Nottue (<i>Agrotis</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	Disporre in serra trappole sessuali. Chimico: • intervenire quando si è accertato il momento di massimo sfarfallamento degli adulti.	• esche avvelenate con <i>Bacillus thuringiensis</i>	
Afidi: Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide della fava (<i>Aphis fabae</i>)	Chimico: • alla comparsa delle prime colonie.	• pirimicarb • imidacloprid (12) • azadiractina • pymetrozine (12)	(12) Al massimo 1 trattamento annuo, a prescindere dal fitofago.

Difesa fitosanitaria integrata del lilyum

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FISIOPATIE Scottatura o Necrosi fogliare	Agronomico: • realizzare l'ombreggiamento delle serre; • effettuare un'accurata ventilazione; • abbassare la temperatura nella serra; • irrigare con acque piovane; • somministrare cloruro di calcio per via fogliare.		
VIROSI LSV - Virus latente del lilyum CMV - Virus del mosaico del cetriolo	Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Chimico: • lotta agli afidi.		
BATTERIOSI Marciume batterico dei bulbi (<i>Erwina carotovora</i> pv. <i>carotovora</i>):	Agronomico: • effettuare accurato drenaggio del terreno; • effettuare irrigazioni equilibrate; • conservare i bulbi in ambienti idonei; • in pre-impianto disinfeccare il terreno con vapore; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITOGAME Marciumi basali e radicali (<i>Phytophthora</i> spp. e <i>Pythium</i> spp.)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare i ristagni idrici. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in pre-impianto disinfezione il terreno con vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • propamocarb • benalaxil (1) • metalaxil (1) 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(1) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità e dal p.a. impiegato.</p> <p>(2) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p>
Fusariosi (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lili</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare le lesioni ai bulbi; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • utilizzare materiale di propagazione sano; • adottare coltivazioni meno suscettibili.. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del terreno con il vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei bulbi mediante immersione in una soluzione fungicida per 15-20 minuti; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • benomil (2) • carbendazim (2) • tiofanato-metile (2) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rizottoniosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	<p>Agromomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire un accurato drenaggio ed equilibrare concimazioni; • trapiantare superficialmente; • effettuare una buona aerazione dell'ambiente in colture protetta. <p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfeccare il terreno con il vapore o con la solarizzazione. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concia dei bulbi. • ai primi sintomi. 	<p>(3) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(4) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p> <p>benomil (3) carbendazim (3) tiofanato-metile (3) tolclofos-metile (4) iprodone (4)</p>	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Mal dello sclerotio (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare i ristagni di umidità; • controllare l'umidità nella serra; • distruggere le piante infette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei bulbi mediante immersione per 30 minuti in una soluzione fungicida; • alla comparsa dei primi sintomi. 	<p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p> <p>(6) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre la concia, indipendentemente dall'avversità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • benomil (5) • carbendazim (5) • dicloran • procimidone (6) • <i>Coniothyrium minitans</i> 	<p>(5) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre alla concia, indipendentemente dall'avversità. I trattamenti alla parte aerea sono autorizzati solo per le colture in pieno campo.</p> <p>(6) Al massimo 2 trattamenti annui, oltre la concia, indipendentemente dall'avversità.</p>
Muffa grigia (<i>Botrytis elliptica</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare una buona aerazione della serra; • evitare le irrigazioni a pioggia. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in pre-fioritura. 	<ul style="list-style-type: none"> • procimidone • iprodione • clozolinato • fludioxonil + cyprodinil 	<p>Per il contenimento di questa avversità è ammesso al massimo 1 intervento per ciclo culturale.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più lanci di ausiliari: <i>Phytoseiulus persimilis</i> (4 ind/mq) <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> (4 ind/mq) <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • clofentezine • exitiazox • benzossimato • bromopropilato • feniproximate (7) • tebufenpirad • <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Eseguire al massimo 1 trattamento solo in caso di mancato controllo biologico da parte degli ausiliari.</p> <p>(7) Esclusivamente in pieno campo.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Haeliothrips haemorrhoidalis</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distruggere i residui culturali; • eliminare le infestanti. <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più lanci degli ausiliari: <i>Orius spp.</i>, (per la <i>F. occidentalis</i>). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installare trappole cromotropiche di colore azzurro. • intervenire alle prime catture in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<p>• <i>Orius spp.</i></p> <p>fosalone (8)</p> <p>acrinatrina (E-FLO) (8)</p> <p>piretro naturale</p> <p>lufenuron</p> <p>azadiractina</p> <p><i>Beauveria bassiana</i></p>	(8) Effettuare al massimo 1 trattamento indipendentemente dal fitofago.
Afidi Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide delle cucurbitacee (<i>Aphis gossypii</i>) Afide della fava (<i>A. fabae</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa delle prime colonie effettuare 1. lanci di <i>Aphidius colemani</i> (1individuo/mq), se prevale il <i>Myzus persicae</i>. 2. lanci di <i>Lysiphlebus testaceipes</i> (1individuo/mq), se prevale l'<i>Aphis gossypii</i>. 3. lanci di <i>Chrysoperla carnea</i> (5 individui/mq). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in caso di forti pullulazioni non controllabili con gli ausiliari. 	<p>• <i>Aphidius colemani</i></p> <p>• <i>Lysiphlebus testaceipes</i></p> <p>• <i>Chrysoperla carnea</i></p> <p>piretro naturale</p> <p>pirimicarb</p> <p>imidacloprid (9)</p> <p>azadiractina</p> <p>pymetrozine (9)</p>	(9) Al massimo 2 trattamenti annui contro questi fitofagi. 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Insetti terricoli (<i>Agrotis</i> spp. ed <i>Agriotes</i> spp.)	Disporre in serra trappole sessuali. Chimico: <ul style="list-style-type: none">• intervenire con prodotti sotto forma di esca quando si è accertato il momento di massimo sfarfallamento degli adulti.	<ul style="list-style-type: none">• esche avvelenate con <i>B. thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Effettuare 1 unico intervento per ciclo culturale.
Nematodi (<i>Ditylenchus dipsaci</i> , <i>Aphelenchoïdes fragariae</i> , <i>Pratylenchus</i> spp.)	Fisico: <ul style="list-style-type: none">• impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente;• disinfeccare il suolo con vapore.		

57 Difesa fitosanitaria integrata della poinsettia

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Rizottinosi <i>(Rhizoctonia solani)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei substrati di coltivazione con vapore o mediante solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • controllare costantemente le temperature nella serra; • distruggere immediatamente le piante colpite; • eseguire trapanti superficiali; • eliminare i residui della vegetazione precedente; • assicurare una buona aerazione degli ambienti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti all'apparato radicale. 	<p>(1) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità e dal principio attivo utilizzato.</p> <p>(2) Al massimo 1 trattamento annuo indipendentemente dall'avversità scegliendo tra questi due principi attivi.</p> <p>• benomil (1) carbendazim (1) tiofanato-metile (1) tolclofos-metile (2) • iprodione (2)</p>	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi basali <i>(Phytophthora spp.)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione dei substrati di coltivazione con vapore o mediante solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • controllare costantemente le temperature nella serra; • eliminare i ristagni idrici; • evitare lesioni ai fusticini. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di sintomi. 	<p>Al massimo avversità. (3) Al massimo indipendentemente dall'avversità e dal p.a. impiegato.</p>	<p>2 trattamenti annui contro questa annua</p> <p>1 trattamento annuo dall'avversità e dal p.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • propamocarb • fosetil-alluminio • benalaxil (3) • metalaxil (3)

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> introdurre, alla presenza delle prime forme mobili, 1-3 individui/pianta o 6-8 individui/mq, ripartiti in 2-3 lanci. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire nel caso il rapporto preda/predatori sia superiore a 30:1, in modo localizzato, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Phytoseiulus persimilis</i> ● clofentezine ● exitiazox ● feniproximate (4) ● tebufenpirad ● benzossimato ● bromopropilato ● oli minerali bianchi (5) ● <i>Beauveria bassiana</i> 	<p>Al massimo 3 trattamenti anni contro questo fitofago.</p> <p>(4) Solo in pieno campo.</p> <p>(5) Verificare preventivamente la fitotossicità su poche piante.</p>
Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	<p>Installare trappole cromotropiche azzurre.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> assicurare un abbondante lavaggio; alle prime catture con le trappole cromotropiche azzurre introdurre 1-2 individui/pianta, ripartiti in 2-3 lanci. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di focolai non controllati dagli ausiliari introdotti, irrigando le piante con abbondanti volumi di acqua, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Orius laevigatus</i> ● <i>Orius majusculus</i> 	<p>(6) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dal fitofago.</p> <p>(7) Verificare preventivamente la fitotossicità su poche piante.</p> <p>(8) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Aleirodi <i>(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)</i>	<p>Installare trappole cromotropiche gialle.</p> <p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare abbondanti lavaggi; • introdurre 0,5-2 pupari/pianta o 6-8 pupari parassitizzati/mq, ripetendo il lancio per 8-10 settimane consecutive, iniziando i lanci in presenza di 0,5-1 adulto/pianta. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire alle prime catture in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<p>• <i>Encarsia formosa</i></p> <p>• piretro naturale • buprofezin • etofenprox (9) • <i>Beauveria bassiana</i> • azadiractina • pymetrozine (9)</p>	(9) A1 massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.

58 Difesa fitosanitaria integrata della rosa

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
VIROSI			
PNRV - Virus della maculatura anulare necrotica del gen. <i>Prunus</i>	Agronomico: • usare portinnesti e marze sani o risanati mediante termoterapia.		
RMV - Virus del mosaico della rosa			
ArMV - Virus del mosaico dell'arabis			
BATTERIOSI			
Tumore batterico (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	Fisico: • disinfezione del terreno con vapore o con solanizzazione. Agronomico: • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • evitare ferite in fase di trapianto; • mettere a dimora le piante nei mesi autunno-vernnini; • estirpare e distruggere le piante infette; • disinsettare gli attrezzi di potatura con ipoclorito di sodio.		

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Marciumi radicali <i>(Armillariella mellea, Rosellinia necatrix)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del terreno con vapore o con solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare portinnesti meno suscettibili; • effettuare un accurato drenaggio; • eseguire irrigazioni e concimazioni equilibrate; • evitare le ferite alle radici; • distruggere le piante infette. 		(1) Al massimo 2 trattamenti annui con i derivati benzimidazolici, indipendentemente dall'avversità.
Verticilliosi <i>(Verticillium dahliae)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del terreno con vapore o con solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • distruggere le piante affette. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subito dopo il trapianto o alla comparsa dei primi sintomi. 		<ul style="list-style-type: none"> • benomil (1) • carbendazim (1) • tiofanato-metile (1)

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ D'INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Canceri rameali e dell'innesto <i>(Diaporthe spp., Coniothyrium spp.)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate; • arriegerre le serre; • controllare le temperature dell'aria e del terreno; • asportare i rametti colpiti; • disinfeccare gli attrezzi da pota con ipoclorito di sodio. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presenza dei sintomi, dopo la potatura ed alla ripresa vegetativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • ossicloruri o idrossidi di rame • bitertanolo (2) • ditiarion 	<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questa avversità.</p> <p>(2) Al massimo 3 trattamenti annui con gli IBE, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Verificare preventivamente l'eventuale fitotossicità.</p> <p>(4) Con gli IBE al massimo 3 trattamenti anni, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Ammessi non più di tre trattamenti annui con le stroblature indipendentemente dall'avversità da controllare.</p>
Oidio <i>(Sphaerotheca pannosa var. rosae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare le foglie ed i getti colpiti; • effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • zolfo (3) • bupirimate • miclobutanil (4) • bitertanolo (4) • esaconazolo (4) • penconazolo (4) • propiconazolo (4) • tetriconazolo (4) • pyrifenoxy (4) • difenoconazolo (4) • <i>Ampelomyces quisqualis</i> • trifloxystrobin (5) 	

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Macchia nera o Ticchiolatura <i>(Diplocarpon rosae)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbassare l'umidità relativa al disotto dell'85%, mediante ventilazione e riscaldamento; • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • scegliere cultivar resistenti; • evitare di bagnare le foglie con l'irrigazione; • distruggere, per quanto possibile, le foglie infette in autunno. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa delle prime macchie fogliari. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • diclofluanide • dodina • ditianon • miclobutanol (6) 	(6) Con gli IBE al massimo 3 trattamenti anni, indipendentemente dall'avversità.
Ruggine <i>(Phragmidium mucronatum; P. tuberculatum; P. subcorticium)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riscaldamento e ventilazione adeguati della serra; • raccolta e distruzione delle foglie e dei rametti infetti. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • ossicarbossima • bitertanolo (7) • penconazolo (7) • tetraconzolo (7) 	(7) Con gli IBE al massimo 3 trattamenti anni, indipendentemente dall'avversità.

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Muffa grigia <i>(Botrytis cinerea)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare le irrigazioni sopra chioma e gli eccessi idrici; • evitare i repentini sbalzi termici; • evitare gli impianti troppo fitti; • evitare lo sgocciolamento dell'acqua di condensa (mediante impiego di sottotelo). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare trattamenti preventivi in pre-fioritura se questa si verifica in un periodo particolarmente umido. 	<ul style="list-style-type: none"> • fludioxonil + cyprodinil (8) • iprodione (9) • procimidone (9) • clozolinate (9) • composti rameici 	<p>(8) Con la miscela fludioxonil + cyprodinil al massimo 2 trattamenti annui.</p> <p>(9) Con i derivati dicarbossimidici al massimo 2 trattamenti annui, in miscela con composti rameici</p>
Peronospora <i>(Peronospora sparsa)</i>	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attenersi alle misure di profilassi già descritte per la Muffa grigia ed utilizzare varietà meno suscettibili. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei primi sintomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • composti rameici • cinoxanil • metalaxil (10) • benalaxil (10) 	<p>(10) Con i derivati fenilammidici al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità e dal p.a. impiegato.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI			
Afidi: Afidone della rosa (<i>Macrosiphum rosae</i>) Afide rosato (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Afide verde del pesco (<i>Myzus persicae</i>) Afide verde maggiore della rosa (<i>Metopolophium dirhodum</i>)	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla prima comparsa effettuare i lanci in misura di 5 larve per mq di Crisopa ed 1 individuo per mq di <i>Aphidius ervii</i>. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> intervenire in modo localizzato solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Chrysoperla carnea</i> • <i>Aphidius ervii</i> • piretro naturale • pirimicarb • imidacloprid (11) • azadiractina • pymetrozine (11) 	<p>Ammessi al massimo 2 trattamenti afidi.</p> <p>(11) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dall'avversità.</p>
Cicalina (<i>Typhlocyba rosae</i>)	<p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> evitare le coltivazioni in areali umidi e vicino ad una ricca vegetazione spontanea. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in vivaio, alla presenza; in serra, solo su forti infestazioni. 		<p>Al massimo 2 trattamenti annui contro questo parassita.</p> <p>(12) Al massimo 2 trattamenti annui, indipendentemente dall'avversità.</p>

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Tripidi <i>(Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci)</i>	<p>Installare le trappole cromotropiche azzurre. Biologico: Alle prime catture con le trappole lanciare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Orius laevigatus</i> (1 individuo per mq); • <i>Amblyseius cucumeris</i> (50-100 forme mobili per mq), ripetendo i lanci 2-3 volte a breve distanza. <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire a distanza di 7-10 giorni dai lanci, se permangono elevati livelli di infestazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Orius laevigatus</i> • <i>Amblyseius cucumeris</i> 	<p>(13) Al massimo 2 trattamenti annui indipendentemente dall'avversità. (14) Valutare preventivamente l'eventuale fitotossicità.</p> <p>(15) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dal fitofago.</p>
Tentredini <i>(Argo rosae)</i>	<p>Meccanico: • asportazione e distruzione delle parti di pianta colpite.</p> <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa dei primi danni, ed eseguendo trattamenti, se possibile, localizzati. 		<p>(16) Al massimo 2 trattamenti annui, scegliendo nell'ambito di questi due principi attivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • fenitroton (16) • fosalone (16)

AVVERSITÀ DA CONTROLLARE	EPOCA E MODALITÀ DELL' INTERVENTO	MEZZI DI CONTROLLO	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Ragnetto rosso <i>(Tetranychus urticae)</i>	<p>Biologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla comparsa delle prime forme mobili lanciare il fitoside (4 individui per mq, ripartiti in 2 o più lanci). <p>Chimico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in modo localizzato, solo in caso di mancata efficacia del controllo biologico da parte degli ausiliari, a distanza di almeno 7-10 giorni dai lanci. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Phytoseiulus persimilis</i> 	<p>Al massimo 3 trattamenti annui contro questo fitofago.</p> <p>(17) Al massimo 1 trattamento annuo, scegliendo tra questi due principi attivi.</p> <p>(18) Al massimo 1 trattamento annuo, indipendentemente dall'avversità.</p>
Nematodi <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<p>Fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disinfezione del terreno con vapore o con solarizzazione. <p>Agronomico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scelta di varietà tolleranti; • ampie rotazioni. 		

59 Norme tecniche per il diserbo

59.1 Premessa

Le erbe infestanti, come è noto, sono in grado di condizionare negativamente la resa di una coltura sia per competizione diretta rispetto alla disponibilità di acqua, luce, elementi nutritivi, spazio vitale per lo sviluppo delle radici e delle parti aeree, sia per i danni indiretti che possono essere ascrivibili alla presenza nel raccolto di loro parti o semi, a cattivi sapori negli insilati o alla presenza di erbe tossiche negli erbai, alla creazione di un microclima favorevole allo sviluppo di crittogramme o al fatto che talune erbacee possono essere ospiti di parassiti o virus dannosi per la coltura.

La presenza di erbe spontanee, d'altra parte, presenta anche degli aspetti positivi, riferibili soprattutto alle ripercussioni che essa ha sulle caratteristiche chimico-fisiche del suolo (miglioramento della struttura, aumento del contenuto in sostanza organica con conseguente diminuzione della lisciviazione di alcuni elementi nutritivi ed aumento della disponibilità degli stessi per le piante, ecc.), alla diminuzione dei fenomeni di erosione sia di tipo eolico che di tipo idrico, all'aumento dell'infiltrazione nel suolo dell'acqua piovana con conseguente beneficio per il suo contenuto idrico, al mantenimento delle popolazioni di insetti pronubi, dai quali come è noto dipende l'impollinazione della maggior parte dei vegetali superiori.

Pertanto, nella maggior parte dei casi, nel diserbo delle colture bisogna tenere ben presente che l'obiettivo da perseguire non è quello di avere una coltivazione che si presenti sempre e comunque completamente priva di maledette, ma di fare in modo che il loro grado di infestazione non superi quella che viene definita "soglia di tolleranza", cioè quel livello di infestazione oltre il quale si determina un danno per la coltura praticata. Il rischio di nocività per le erbe infestanti non è facile da stabilire, anche se si è accertato che le soglie di tolleranza sono generalmente abbastanza alte e si innalzano ancora di più quando si parla di vite e di alberi da frutto.

Le tecniche a disposizione per poter conseguire il controllo della flora avventizia, come è noto, possono essere di tipo agronomico, meccanico e chimico.

Nel corso degli anni la pratica del diserbo chimico, favorita anche dal crescente aumento dei costi della manodopera, è diventata preponderante rispetto agli altri metodi di controllo. Tuttavia, tale metodo, se da un lato può risultare quello più rapido ed efficiente per pervenire al controllo delle infestanti, dall'altro può determinare l'insorgere di problemi legati ad un uso irrazionale ed indiscriminato degli erbicidi, quali inquinamento del suolo e delle falde acquifere, sviluppo privilegiato di alcune specie poco sensibili all'azione fitotossica dell'erbicida a danno delle specie più sensibili, con conseguente "inversione della flora", induzione di fenomeni di resistenza nelle maledette da combattere.

Partendo da queste considerazioni, analogamente a quanto è accaduto per altri aspetti della difesa fitosanitaria delle colture, anche nel caso del diserbo ci si è resi conto che quello chimico, pur apparendo talora insostituibile, quando necessario va effettuato in maniera ponderata e mirata, integrandolo con l'utilizzazione di appropriate tecniche agronomiche (diserbo meccanico tra le file, falsa semina, pacciamatura, ecc.) e modalità di applicazione dei formulati (diserbo localizzato sulla fila, utilizzazione di prodotti a bassa persistenza e nella fase di post-emergenza delle infestanti, ecc.), che insieme all'introduzione di nuove molecole ad azione erbicida dotate di maggiore selettività e bassa persistenza, sicuramente possono contribuire a ridurre al minimo l'impatto ambientale di questa pratica agricola.

59.2 Il controllo integrato delle infestanti nei frutteti, nel vigneto e nell'oliveto

Il controllo integrato delle infestanti nei frutteti, nel vigneto e nell'oliveto va attuato secondo le seguenti modalità:

- negli impianti irrigui, laddove possibile, è buona pratica filtrare le acque di irrigazione per evitare la diffusione di semi e di altri organi di propagazione della flora infestante;
- di norma non si consiglia alcun intervento di controllo delle infestanti nella stagione autunno-vernina, in considerazione del ridotto fabbisogno idrico-nutrizionale che presentano le colture arboree in tale periodo;
- laddove non esistono problemi di competizione idrica o in quei frutteti situati su terreni con pendenze superiori al 5% e suscettibili di fenomeni di erosione, si consiglia di ricorrere sempre all'inerbimento dell'interfila, controllando l'eccessivo sviluppo delle infestanti nel periodo aprile-ottobre;
- nei frutteti nei quali esistono problemi di insufficiente disponibilità idrica, durante il periodo estivo si consiglia di ricorrere al diserbo meccanico dell'interfila;
- il controllo delle infestanti sulla fila va comunque attuato in via preferenziale ricorrendo alla pacciamatura organica e/o alle lavorazioni meccaniche. Nei frutteti di età inferiore ai tre anni ed in tutti quei casi in cui le lavorazioni meccaniche lungo la fila risultino eccessivamente difficoltose e la pacciamatura organica particolarmente rischiosa per motivi fitosanitari, è consentito il ricorso ad operazioni di controllo chimico;
- nelle coltivazioni di castagno, fico e kaki non è mai permesso il diserbo chimico. In particolare, il controllo delle infestanti va praticato: per il castagno, facendo ricorso esclusivamente a sfalci della flora spontanea da effettuarsi essenzialmente durante il periodo estivo; per il fico ed il kaki facendo ricorso allo sfalcio della flora spontanea in quelle coltivazioni nelle quali non ci sono problemi di disponibilità idrica, a lavorazioni superficiali, da effettuarsi durante il periodo estivo, nelle coltivazioni localizzate negli areali più siccitosi.

Controllo chimico

Le colture arboree per le quali è previsto il diserbo chimico nell'ambito del Piano Regionale di Lotta Fitopatologica integrata e quindi del "Programma regionale per l'agricoltura compatibile con l'ambiente" (Reg. Cee 2078/92) e del Piano di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1257/99) sono di seguito indicate: actinidia, agrumi, albicocco, ciliegio, melo, nocciolo, noce, olivo, pero, pesco, susino e vite.

Il controllo chimico delle malerbe potrà essere effettuato solo sulla fila, esclusivamente nei casi precedentemente menzionati e comunque per una larghezza massima di cm 70, unicamente in post-emergenza delle infestanti. Inoltre, esso è consentito, limitatamente alle piazze di raccolta, anche negli oliveti situati su appezzamenti caratterizzati da una forte presenza di grosse pietre o di rocce affioranti.

I principi attivi il cui impiego è consentito per il diserbo delle colture sopra indicate sono riportati nella tabella seguente, essi possono essere utilizzati a dose piena per una sola volta oppure, quando previsto, a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore alla dose massima consentita.

E' obbligatorio escludere i formulati classificati "Molto Tossici, Tossici o Nocivi" (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti" o "Non classificati" (ex III e IV classe).

In linea generale, le norme da osservare per una buona riuscita del diserbo chimico sono le seguenti:

1. conoscere la composizione della flora infestante da controllare ed il suo grado di nocività;
2. conoscere lo stadio fenologico e vegetazionale delle colture, nonché le caratteristiche fisiologiche e lo stadio fenologico delle maledette da controllare;
3. porre molta attenzione nella scelta dei principi attivi, da effettuarsi tra quelli inseriti nella tabella seguente, e dei loro formulati commerciali in funzione:
 - delle maledette da controllare;
 - dell'epoca in cui va effettuato il trattamento;
 - delle caratteristiche chimico-fisiche del diserbante e delle sue modalità d'azione;
4. evitare il ricorso ad interventi troppo drastici che spesso non solo sono inutili, ma possono portare allo sviluppo di specie resistenti, all'inversione della flora infestante ed all'erosione del suolo;
5. utilizzare un appropriato grado di polverizzazione della miscela diserbante in funzione delle sue modalità d'azione;
6. impiegare un'idonea tecnica di distribuzione dell'erbicida da utilizzare, per una migliore efficacia dell'intervento;
7. effettuare il trattamento nelle ore serali, che generalmente sono le più idonee a tale operazione per assenza di vento, condizioni di umidità, ecc.

59.2.1 Principi attivi consentiti nel diserbo di: Actinidia, Agrumi, Albicocco, Ciliegio, Melo, Nocciolo, Noce, Olivo, Pero, Pisco, Susino e Vite.

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose max di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Durante tutto l'anno	Glifosato ¹ (fosfororganico)	30,4	5	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Dalla primavera a tutta l'estate	Glufosinate ammonio (fosfororganico)	11,33	8	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Per l'actinidia ed il nocciolo sono autorizzati solo i formulati al 29% di p.a.

59.3 Il controllo integrato delle infestanti delle colture erbacee e della fragola

Il controllo integrato delle infestanti delle colture erbacee e della fragola va attuato secondo le seguenti modalità:

- negli impianti irrigui, laddove possibile, è buona pratica filtrare le acque di irrigazione per evitare la diffusione di semi e di altri organi di propagazione della flora infestante;
- praticare l'avvicendamento colturale, onde evitare la semplificazione della flora infestante ed al tempo stesso diminuire la pressione esercitata da quelle specie che può essere difficile controllare in presenza della stessa coltivazione;
- quando possibile utilizzare la tecnica della preparazione anticipata del letto di semina (falsa semina), così da poter eliminare le infestanti emerse;
- quando possibile utilizzare il mezzo meccanico per il controllo delle infestanti nate tra le file;
- nelle colture pacciamate con film di PE estirpare manualmente le infestanti che dovessero svilupparsi nel foro della pacciamatura;
- il controllo chimico delle infestanti potrà essere effettuato solo sulle superfici effettivamente destinate alle colture, nelle rimanenti aree improduttive (capezzagne, arginelli, bordi stradali o di canali, ecc.) si potrà ricorrere solo ad interventi di tipo meccanico.
- E' obbligatorio escludere i formulati classificati "Molto Tossici, Tossici o Nocivi" (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti" o "Non classificati" (ex III e IV classe).
- il controllo chimico delle infestanti potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - esclusivamente con interventi effettuati in post-emergenza delle infestanti e solo nella fase di pre-trapianto, utilizzando i principi attivi consentiti per ogni singola coltura dalle presenti norme tecniche, a dose piena per una sola volta oppure, quando previsto, a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore alla dose massima consentita, nelle colture protette;
 - esclusivamente con interventi in post-emergenza delle infestanti ed esclusivamente nelle epoche indicate nella colonna "Periodo di intervento" utilizzando i principi attivi consentiti per ogni singola coltura dalle presenti norme tecniche, a dose piena per una sola volta oppure, quando previsto, a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore alla dose massima consentita, nelle seguenti colture: basilico, cetriolo, zucchino, zucca, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoletto di rapa, cipolla, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pomodoro da mensa in coltura protetta, prezzemolo, rucola, sedano, orzo, avena, segale, frumento tenero e duro;
 - sulle seguenti colture: aglio, asparago, bietola da foglia e da costa, carota, carciofo, patata, pisello, spinacio, barbabietola da zucchero, pomodoro in pieno campo, tabacco, mais, girasole:
 - I. con interventi in post-emergenza delle infestanti ed esclusivamente nelle epoche indicate nella colonna "Periodo di intervento", utilizzando i principi attivi consentiti per ogni singola coltura dalle presenti norme tecniche, a dose piena per una sola volta oppure a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore alla dose massima consentita;
 - II. con interventi in pre-emergenza delle infestanti ed esclusivamente nelle epoche indicate nella colonna "Periodo di intervento", intervenendo su tutto l'appezzamento nel caso dell'asparago e dello spinacio, solo sulla fila, su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dello spazio dell'interfila, per le altre colture, utilizzando i principi attivi consentiti per ogni singola coltura dalle presenti norme tecniche, a dose piena per una sola volta oppure a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore

alla dose massima consentita. Nel caso di trattamenti localizzati il controllo delle malerbe nate nell'interfila è assicurato tramite interventi meccanici.

I principi attivi il cui impiego è consentito per il diserbo delle colture sopra indicate sono riportati nelle tabelle seguenti, essi possono essere utilizzati a dose piena per una sola volta oppure a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore alla dose massima consentita.

In linea generale, le norme da osservare per una buona riuscita del diserbo chimico sono le seguenti:

1. conoscere la composizione della flora infestante da controllare ed il suo grado di nocività;
2. conoscere lo stadio fenologico e vegetazionale della coltura, nonché le caratteristiche fisiologiche e lo stadio fenologico delle malerbe da controllare;
3. porre molta attenzione nella scelta dei principi attivi, da effettuarsi tra quelli inseriti nelle tabelle relative a ciascuna coltura, e dei loro formulati commerciali in funzione:
 - delle malerbe da controllare;
 - dell'epoca in cui va effettuato il trattamento;
 - delle caratteristiche chimico-fisiche del diserbante e delle sue modalità d'azione;
4. evitare il ricorso ad interventi troppo drastici che spesso non solo sono inutili, ma possono portare allo sviluppo di specie resistenti, all'inversione della flora infestante ed all'erosione del suolo;
5. utilizzare un appropriato grado di polverizzazione della miscela diserbante in funzione delle sue modalità d'azione;
6. impiegare un'idonea tecnica di distribuzione dell'erbicida da utilizzare, per una migliore efficacia dell'intervento;
7. effettuare il trattamento nelle ore serali, che generalmente sono le più idonee a tale operazione per assenza di vento, condizioni di umidità, ecc.

59.3.1 Principi attivi consentiti nel diserbo dell'aglio

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale l-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Oxadiazon (ossidiazolinoni)	25,5	1-1,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	2-3	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
Post-emergenza	Ioxinil (nitroderivato)	28,7	0,1-0,7	Contatto - assorbimento fogliare	essenzialmente dicotiledoni	post-emergenza
	Oxifluorfen ¹ (nitroderivato)	22	0,1-0,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ² (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Preferire dosaggi ridotti ed eventualmente ripetuti (10-12 gg.).

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Propaquizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 30gg.; Setossidim n.c.

59.3.2 Principi attivi consentiti nel diserbo dell'asparago

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto e dopo la raccolta dei turioni	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	3-5	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Prima della fuoriuscita dei turioni	Metribuzin ¹ (triazina)	35	0,4-0,7	Sistemico - assorbimento per via radicale e fogliare.	essenzialmente dicotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	2-3	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
Post-raccolta dei turioni	Cicloxdimid ² (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxlyfop-r-methyl estere ² (fenossiderivato)	10,63	0,7	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Non ammesso su terreni sabbiosi.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxdimid 20 gg.; Haloxlyfop-r-methyl estere 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.

59.3.3 Principi attivi consentiti nel diserbo del basilico

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale l-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosfororganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

59.3.4 Principi attivi consentiti nel diserbo della bietola da foglie e da costa

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale l-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosfororganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Cloridazon (piridazina)	65	2-4	sistemico - assorbito essenzialmente per via radicale	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
Post-emergenza	Setossidim (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

59.3.5 Principi attivi consentiti nel diserbo del carciofo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto o prima della ripresa vegetativa per le carciofaie dal 2° anno in poi	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Subito dopo il trapianto o prima della ripresa vegetativa per carciofaie dal 2° anno in poi	Oxadiazon (ossidiazolinoni)	25,5	1,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Oxifluorfen ¹ (nitroderivato)	22	1-1,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	2-3	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
Dopo il trapianto, superata la crisi di attecchimento, o dopo la ripresa vegetativa per carciofaie dal 2° anno in poi	Imazametabenz (imidazolinone)	19,2	1,5	sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale	monocotiledoni dicotiledoni	post-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Porre molta attenzione ai periodi di sicurezza ed utilizzare attrezzi opportunamente schermati.

Principi attivi consentiti nel diserbo del carciofo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
In qualsiasi momento dopo l'impianto o dopo la rincalzatura per carciofaie dal 2° anno in poi	Cicloxicidim ² (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,33	1-2	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxaprop-p-etile ² (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni	post-emergenza
	Haloxifop-r-methyl estere ² (fenossiderivato)	10,63	0,7	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setosidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ² (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 20 gg.; Haloxifop-r-methyl estere 60 gg.; Fenoxaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 30 gg.; Setosidim n.c.

59.3.6 Principi attivi consentiti nel diserbo della carota

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti[^]
Pre-semina	Glifosate (fosfororganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosfororganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Aclonifen (nitroderivato)	49	1,5-2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'epicotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Fallopia convolvulus</i>	pre-emergenza
	Pendimetalin ¹ (nitroderivato)	31,7	3	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Solanum nigrum</i> .	pre-emergenza post-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Impiego consentito anche in post-emergenza a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo palco fogliare (4 foglie vere).

Principi attivi consentiti nel diserbo della carota

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti [^]
Post-emergenza	Cicloxicidim ² (cicloesenone)	10,9	1,5-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxifop-r-methyl estere ² (fenossiderivato)	10,63	0,4-0,75	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Metribuzin ³ (triazina)	35	0,4-0,6	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Propaqizafop ² (fenossiderivato)	9,7	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ² (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 80 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Haloxifop-r-methyl estere 40 gg.; Propaqizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 30 gg.; Setossidim n.c.

³ Non ammesso su terreni sabbiosi, da impiegarsi a partire da quando le carote hanno completamente formato il secondo palco fogliare (4 foglie vere).

59.3.7 Principi attivi consentiti nel diserbo del cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza e broccioletto di rapa

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio ¹ (fosforganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-trapianto	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Oxifluorfen ³ (nitroderivato)	23,6	1,5-2,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Propaqizafop ^{2,4} (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Autorizzato solo su cavolo rapa.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fluazifop-p-butile 30gg.; Propaqizafop 30 gg.; Setossidim n.c.

³ Autorizzato solo in post-emergenza delle infestanti, le quali devono trovarsi nello stato di post-emergenza precoce: 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e 2 foglie vere per le monocotiledoni.

⁴ Autorizzato solo su cavolo cappuccio e cavolo broccolo.

59.3.8 Principi attivi consentiti nel diserbo del cetriolo, della zucca e dello zucchino

(A) In serra ed in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

(B) in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-trapianto	Fluazifop-p-butile ^{1,2} (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ^{2,3} (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Autorizzato solo su cetriolo.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fluazifop-p-butile 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 30 gg.; Setossidim n.c.

³ Autorizzato solo su zucchino.

59.3.9 Principi attivi consentiti nel diserbo della cipolla

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-emergenza	Ioxinil (nitroderivato)	28,7	0,1-0,7	Contatto - assorbimento fogliare	essenzialmente dicotiledoni	post-emergenza
	Oxifluorfen ¹ (nitroderivato)	23,6	0,05-0,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxaprop-p-etile ² (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Cicloxicidim ² (cicloesenone)	21	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ² (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Autorizzato solo in post-emergenza delle infestanti, le quali devono trovarsi nello stato di post-emergenza precoce: 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e 2 foglie vere per le monocotiledoni. Non selettivo su cv precocissime. Preferire dosaggi ridotti ed eventualmente ripetuti (10-12 gg.).

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 60 gg.; Fenoxaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 60 gg.; Setossidim n.c.

59.3.10 Principi attivi consentiti nel diserbo del fagiolino

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha[*]	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti[^]
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Linuron (ureico)	37,6	0,7-1,2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza
Post-emergenza	Cicloxicidim ¹ (cicloesenone)	10,9	1,5-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Imazamox (Imidazolinoni)	3,7	0,75	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxyprop-p-etile ¹ (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ¹ (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxifop-r-methyl estere ¹ (fenossiderivato)	10,63	0,4-0,75	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setoxolidim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ¹ (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

^{*} Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 30 gg.; Fenoxyprop-p-etile 30 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg; Haloxifop-r-methyl estere 40 gg.; Quizalofop etile isomero D 20 gg.; Setoxolidim n.c.

59.3.11 Principi attivi consentiti nel diserbo del fagiolo¹

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti [^]
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Linuron (ureico)	37,6	0,7-1,4	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza
Post-emergenza	Fomesafen (nitroderivato)	22,5	0,5	assorbimento per via fogliare e radicale, ma poco traslocato	dicotiledoni	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Imazamox (Imidazolinoni)	3,7	0,75	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Cicloxicidim ² (cicloesenone)	21	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

¹ N.B. Valutare attentamente l'eventuale scelta del diserbante in funzione della diversa sensibilità a livello varietale.

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg; Propaquizafop 30 gg.; Setossidim n.c.

59.3.12 Principi attivi consentiti nel diserbo della fava da granella

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-emergenza	Fluazifop-p-butile ¹ (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxyaprop-p-etile ¹ (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fenoxyaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Setossidim n.c.

59.3.13 Principi attivi consentiti nel diserbo del finocchio

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale l-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Prometrina ¹ (triazina)	48,5	2	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-trapianto	Linuron ¹ (ureico)	37,6	0,5-1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Cicloxicidim ² (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxifop-r-methyl estere ² (fenossiderivato)	10,63	0,4-0,75	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Uso consentito esclusivamente in post-emergenza delle infestanti.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 30 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Haloxifop-r-methyl estere 70 gg.; Setossidim n.c.

59.3.14 Principi attivi consentiti nel diserbo della lattuga e dell'indivia

(A) In serra ed in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

(B) In pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-trapianto	Cicloxicidim ¹ (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaqquizafop ^{1,2} (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propizamide ³ (ammide)	35,5	2,5-3,5	sistemico - assorbito prevalentemente per via radicale	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 30 gg.; Propaqquizafop 30 gg.; Setossidim n.c.

² Non autorizzato su indivia.

³ Uso consentito esclusivamente in post-emergenza delle infestanti.

59.3.15 Principi attivi consentiti nel diserbo della melanzana

(A) In serra ed in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

(B) In pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-emergenza	Cicloxdidim ¹ (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxyaprop-p-etile ¹ (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ¹ (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setoxididim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxdidim 20 gg.; Fenoxyaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Setoxididim n.c.

59.3.16 Principi attivi consentiti nel diserbo melone e del cocomero

(A) In serra ed in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

(B) In pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-trapianto	Fenoxaprop-p-etile ^{1,2} (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ^{1,2} (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxyfop-r-methyl estere ^{1,2} (fenossiderivato)	10,63	0,7	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ^{1,2} (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Autorizzato solo su melone.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fenoxaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Setossidim n.c., Haloxyfop-r-methyl estere 30 gg., Quizalofop etile isomero D 30 gg.

59.3.17 Principi attivi consentiti nel diserbo della patata

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-6	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	3	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Solanum nigrum</i> .	Pre-emergenza post-emergenza
	Metribuzin ¹ (triazina)	35	0,4-0,6	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Metribuzin ¹ + Aclonifen (nitroderivato)	35 49	0,3 1	vedi singoli principi attivi vedi singolo principio attivo	vedi singolo principio attivo vedi singolo principio attivo	pre-emergenza post-emergenza
	Aclonifen (nitroderivato)	49	1,5-2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'epicotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Fallopia convolvulus</i>	pre-emergenza
	Flufenacet (acetammide)	60	0,5-0,8	Sistemico – assorbimento in fase di germinazione per via radicale e del germoglio	monocotiledoni (graminacee) alcune dicotiledoni	pre-emergenza
	Pendimetalin + Metribuzin ¹	31,7 35	2-2,5 0,4-0,6	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	pre-emergenza post-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Non ammesso su terreni sabbiosi.

Principi attivi consentiti nel diserbo della patata

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Post-emergenza	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxaprop-p-etile ² (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Rimsulfuron ³ (sulfonilurea)	25	0,02-0,04	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

^ Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fenoxaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 50 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Setossidim n.c.

³ In miscela con coadiuvante specifico.

59.3.18 Principi attivi consentiti nel diserbo del peperone

(A) In serra ed in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

(B) In pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-emergenza	Cicloxdidim ¹ (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ¹ (fenossiderivato)	13,3	1-2	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxyaprop-p-etile ¹ (fenossiderivato)	6,77	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxdidim 20 gg.; Fenoxyaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Setossidim n.c.

59.3.19 Principi attivi consentiti nel diserbo del pisello¹

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti [^]
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	2-3	Giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Solanum nigrum</i> .	pre-emergenza post-emergenza
	Aclonifen (nitroderivato)	49	1,5-2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'epicotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Fallopia convolvulus</i>	pre-emergenza
Post-emergenza	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1-2	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Imazamox (Imidazolinoni)	3,7	0,75	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ² (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

¹ N.B. Valutare attentamente l'eventuale scelta del diserbante in funzione della diversa sensibilità a livello varietale.

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fluazifop-p-butile 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 30 gg.; Setossidim n.c.

59.3.20 Principi attivi consentiti nel diserbo del pomodoro da mensa in coltura protetta

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

59.3.21 Principi attivi consentiti nel diserbo del prezzemolo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale l-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Prometrina ¹ (triazina)	48,5	2	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-emergenza	Setossidim (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Uso consentito esclusivamente in post-emergenza delle infestanti.

59.3.22 Principi attivi consentiti nel diserbo della rucola

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale l-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
post-emergenza	Setossidim (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propizamide ¹ (ammide)	35,5	2,5-3,5	sistemico - assorbito prevalentemente per via radicale	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Uso consentito esclusivamente in post-emergenza delle infestanti.

59.3.23 Principi attivi consentiti nel diserbo del sedano

(A) In serra ed in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Prometrina ¹ (triazina)	48,5	2	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

(B) In pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-trapianto	Linuron ¹ (ureico)	37,6	0,5-1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Uso consentito esclusivamente in post-emergenza delle infestanti.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Fluazifop-p-butile 30 gg.; Setossidim n.c.

59.3.24 Principi attivi consentiti nel diserbo dello spinacio

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semenza	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	monocotiledoni dicotiledoni	post-emergenza
	Cicloate (carbammato)	72,7	3-4	Sistemico - assorbito allo stato di vapore dai semi in germinazione e dalle radici delle giovani plantule.	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza
	Cicloate + Lenacil	72,7 80	3 0,5-0,7	Vedi singoli principi attivi.	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza
Pre-emergenza	Lenacil (diazina)	80	0,4-0,8	Sistemico - assorbito dai semi in germinazione e dalle radici delle giovani plantule.	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza
Post-emergenza	Fenmedifam (Carbammato)	15,9	1-2	Sistemico - prevalentemente per via fogliare.	monocotiledoni dicotiledoni	post-emergenza
	Fenmedifam + Setossidim	15,9 20	1 1	Vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Cicloxdim ¹ (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxifop-r-methyl estere ¹ (fenossiderivato)	10,63	0,7	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ¹ (fenossiderivato)	9,7	0,8-1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ¹ (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxdim 20 gg.; Setossidim n.c.; Haloxifop-r-methyl estere 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 20 gg.

59.3.25 Principi attivi consentiti nel diserbo della barbabietola da zucchero

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti[^]
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Cloridazon (piridazina)	65	3-4	sistemico - assorbito essenzialmente per via radicale	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Cloridazon + Etofumesate (benzofurano)	65 21,1	0,6-1,5 0,7	vedi singolo principio attivo sistemico - assorbito essenzialmente dai semi in germinazione e per via radicale	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Cloridazon + Etofumesate e Lenacil (diazina)	65 30 12	0,6-1,5 1-1,6	vedi singoli principi attivi sistemico - assorbito dai semi in germinazione e dalle radici delle giovani piantine	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi pre-emergenza
	Metamitron (triazina)	70	3-4	Sistemico - assorbimento per via radicale e fogliare	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Metamitron + Etofumesate	70 21,1	0,6-1,5 0,7	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Metamitron + Etofumesate e Lenacil	70 30 12	0,6-1,5 1-1,6	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Etofumesate e Lenacil	30 12	2-2,5	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

Principi attivi consentiti nel diserbo della barbabietola da zucchero

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-emergenza	Fenmedifam (carbamato) + Cloridazon	15,9 65	1-2 0,6-1,5	assorbito prevalentemente per via fogliare vedi singolo principio attivo	monocotiledoni dicotiledoni vedi singolo principio attivo	post-emergenza vedi singolo principio attivo
	Fenmedifam + Metamitron	15,9 70	1-2 0,6-1,5	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Fenmedifam + Etofumesate	15,9 21,1	1-2 0,7	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Fenmedifam + Metamitron + Etofumesate e Lenacil	15,9 70 30 12	1-2 0,6-1 1-1,6	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Fenmedifam + Metamitron + Etofumesate	15,9 70 21,1	1-2 0,6-1,5 0,7	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Metamitron, Etofumesate e Fenmedifam	28 6,5 6,6	2,6 ¹	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Fenmedifam + Etofumesate + Cloridazon	15,9 21,1 65	1-2 0,7 0,6-1,5	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	(Fenmedifam, Etofumesate Desmedifam) + Cloridazon	5,9 12,2 1,5 65	1-1,5 0,6-1,5	vedi singoli principi attivi assorbito prevalentemente per via fogliare vedi singolo principio attivo	vedi singoli principi attivi dicotiledoni vedi singolo principio attivo	vedi singoli principi attivi post-emergenza vedi singolo principio attivo
	(Fenmedifam, Etofumesate Desmedifam) + Metamitron	5,9 12,2 1,5 70	1-1,5 0,6	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Da applicare con due trattamenti frazionati da 1,3 Kg/ha, a distanza di 7-10 gg., intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni-2 foglie vere).

Principi attivi consentiti nel diserbo della barbabietola da zucchero

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-emergenza	(Fenmedifam, Etofumesate e Desmedifam) + Metamitron + Lenacil	5,9 12,2 1,5 70 80	1-1,5 0,5 0,1	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Desmedifam, Etofumesate e Fenmedifam	1,5 12,2 5,9	1,5-2,5	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Propizamide ² (ammide)	35,5	0,75-4	sistemico - assorbito prevalentemente per via radicale	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ³ (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxyprop-p-etile ³ (fenossiderivato)	6,77	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Cicloxitidim ³ (cicloesenone)	21	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ³ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Triflusulfuron-metile ⁴ (sulfonilurea)	50	0,04-0,05	sistemico - rapido assorbimento fogliare, ma anche radicale.	dicotiledoni	post-emergenza
	Propaquizafop ³ (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxifop-r-methyl estere ³ (fenossiderivato)	10,63	0,7	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ³ (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

² Da utilizzarsi prevalentemente nel caso di problemi di cuscuta, uso consentito solo con trattamenti localizzati a dosi ridotte.

³ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxitidim 100 gg.; Fenoxyprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 60 gg.; Haloxifop-r-methyl estere 90 gg.; Propaquizafop 60 gg.; Quizalofop etile isomero D 60 gg.; Setossidim n.c.

⁴ In miscela con bagnante specifico o olio bianco alla dose di 0,5 l/ha.

59.3.26 Principi attivi consentiti nel diserbo del pomodoro in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Aclonifen (nitroderivato)	49	1,5-2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'epicotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni Particolarmente efficace per il controllo di <i>Fallopia convolvulus</i>	pre-emergenza post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	2-2,5	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Solanum nigrum</i> .	Pre-emergenza post-emergenza
	Oxadiazon (ossidiazolinoni)	25,5	1,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Flufenacet (acetammide)	60	0,5-0,8	Sistemico – assorbimento in fase di germinazione per via radicale e del germoglio	monocotiledoni (graminacee) alcune dicotiledoni	pre-emergenza
	Metribuzin ¹ (triazina)	35	0,3-0,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Non ammesso in terreni sabbiosi.

Principi attivi consentiti nel diserbo del pomodoro in pieno campo

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-trapianto	Metribuzin ¹ (triazina)	35	0,2-0,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Rimsulfuron ² (sulfonilurea)	25	0,03-0,04	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ^{2,3} (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxaprop-p-etile ³ (fenossiderivato)	6,77	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ³ (cicloesenoone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Cicloxdidim ³ (cicloesenoone)	21	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaqizafop ³ (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ³ (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Non ammesso in terreni sabbiosi, l'impiego in post-emergenza è consentito solo in presenza di infestazioni di *Solanum nigrum* o se il p.a. non è già stato utilizzato in pre-emergenza.

² in miscela con coadiuvante specifico.

³ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxdidim 60 gg.; Fenoxaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Propaqizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 60 gg.; Setossidim n.c.

59.3.27 Principi attivi consentiti nel diserbo del tabacco

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Pre-trapianto	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	2-2,5	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Solanum nigrum</i> .	pre-emergenza post-emergenza
	Aclonifen (nitroderivato)	49	1,5-2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'epicotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Fallopia convolvulus</i>	pre-emergenza
	Oxadiazon (ossidiazolinoni)	25,5	1,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
Post-trapianto	Cicloxdimid ¹ (cicloesenone)	10,9	1-2	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxyaprop-p-etile ¹ (fenossiderivato)	6,6	1-1,5	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ¹ (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento rapido (entro 3 ore) e prevalente per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ¹ (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ¹ (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ¹ (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxdimid 30 gg.; Fenoxyaprop-p-etile 60 gg.; Fluazifop-p-butile 30 gg.; Propaquizafop 30 gg.; Quizalofop etile isomero D 30 gg.; Setossidim n.c.

59.3.28 Principi attivi consentiti nel diserbo dell'orzo, dell'avena e della segale

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-emergenza (trattamenti di fine inverno e primaverili)	Clortoluron ^{1,2} (ureico)	43,6	2-2,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via radicale	monocotiledoni dicotiledoni	post-emergenza
	Amidosulfuron (sulfonilurea)	75	0,02-0,04	sistemico - prevalentemente per via fogliare	dicotiledoni	post-emergenza
	Metsulfuron metile ^{1,3}	20	0,015-0,020	sistemico - prevalentemente per via fogliare, ma anche per via radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Tribenuron-metile ¹ (sulfonilurea)	75	0,010-0,015	sistemico - per via fogliare e radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Triasulfuron-metile (sulfonilurea)	20	0,035	sistemico - rapidamente per via fogliare e radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Tralcossidim ^{1,4} (cicloesenone)	22,5	1,7	Sistemico - per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Tifensulfuron-metile ⁵ (sulfonilurea)	75	0,01	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	dicotiledoni	post-emergenza
	Carfentrazone-etile ⁶ (aril-triazolinone)	50	0,040	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Galium aparine</i> e <i>Veronica hederifolia</i>	post-emergenza
	Florasulam ¹ (sulfonilammide)	4,84	0,100-0,125	sistemico - per via fogliare e radicale	dicotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ Non autorizzato su avena e segale.

² Uso consentito esclusivamente in post-emergenza delle infestanti.

³ Non autorizzato quando sono previste colture a semina estiva in terreni nei quali si eseguono trattamenti primaverili o quando nella stagione successiva è prevista la semina di barbabietola.

⁴ In miscela con bagnante specifico.

⁵ In miscela con coadiuvante specifico; non autorizzato su segale.

⁶ Non applicare oltre lo stadio di secondo nodo delle colture.

59.3.29 Principi attivi consentiti nel diserbo del frumento

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosforganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Post-emergenza (trattamenti di fine inverno e primaverili)	Clodinafop ¹ (fenossiderivato)	22,2	0,2-0,25	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (1-2 ore)	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxaprop-p-etile ² (fenossiderivato)	5,24	0,75-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (1-2 ore)	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Diclofop-metile (fenossiderivato)	27,3	2	Sistemico - per via fogliare ed in condizioni di elevata umidità anche radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Diclofop-metile e Fenoxaprop-p-etile ²	22,73 1,83	2-2,5	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi	vedi singoli principi attivi
	Clortoluron ³ (ureico)	43,6	2-2,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via radicale	monocotiledoni dicotiledoni	post-emergenza
	Amidosulfuron (sulfonilurea)	75	0,02-0,04	sistemico - prevalentemente per via fogliare	dicotiledoni	post-emergenza
	Metsulfuron metile ⁴	20	0,015-0,020	sistemico - prevalentemente per via fogliare, ma anche per via radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Tribenuron-metile (sulfonilurea)	75	0,010-0,015	sistemico - per via fogliare e radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Triasulfuron-metile (sulfonilurea)	20	0,035	sistemico - rapidamente per via fogliare e radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Tralcossidim ⁵ (cicloesenone)	22,5	1,7	Sistemico - per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

¹ In miscela con bagnante ed antidoto.

² In miscela con l'antidoto fitoprotettore Mefenpir-dimetile.

³ Uso consentito esclusivamente su frumento tenero, in post-emergenza delle infestanti; crea problemi di fitotossicità su varietà Brasilia e Bolero.

⁴ Non autorizzato quando sono previste colture a semina estiva in terreni nei quali si eseguono trattamenti primaverili o quando nella stagione successiva è prevista la semina di barbabietola.

⁵ Uso consentito solo su frumento duro; in miscela con bagnante specifico.

Principi attivi consentiti nel diserbo del frumento

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Post-emergenza (trattamenti di fine inverno e primaverili)	Carfentrazone-etile ⁶ (aryl-triazolinone)	50	0,040	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante	dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Galium aparine</i> e <i>Veronica hederifolia</i>	post-emergenza
	Tifensulfuron-metile ⁷ (sulfonilurea)	75	0,01	Sistemico - assorbimento per via fogliare	dicotiledoni	post-emergenza
	Florasulam (sulfonilammide)	4,84	0,100-0,125	sistemico - per via fogliare e radicale	dicotiledoni	post-emergenza
	Iodosulfuron-metil-sodium (sulfonilurea), Fenoxaprop-p- etile (fenossiderivato) e Mefenpir-dietile (antidoto)	0,78 6,22 2,33	1,25	sistemico - rapido assorbimento per via fogliare e radicale	monocotiledoni (graminacee) dicotiledoni	post-emergenza
	Metribuzin ⁸ (triazina)	35	0,2	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

⁶ Non applicare oltre lo stadio di secondo nodo delle colture.

⁷ In miscela con coadiuvante specifico.

⁸ Da impiegarsi solo in presenza di infestazioni con prevalenza di *Viola* spp., *Papaver* spp., *Veronica* spp. e *Picris echinooides*. Non ammesso su terreni sabbiosi.

59.3.30 Principi attivi consentiti nel diserbo del mais

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Pre-semina	Glifosato (fosfororganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosfororganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Aclonifen (nitroderivato)	49,2	1,5-2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'ipocotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni N.B. particolarmente efficace per il controllo di <i>Fallopia convolvulus</i>	pre-emergenza
	S-Metolaclor (ammide)	87,3	1,25	Assorbito prevalentemente dal coleoptile nelle graminacee e dai cotiledoni e dalle radici delle plantule nelle dicotiledoni. Poco traslocato.	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza
	Flufenacet (acetammide)	60	0,5-0,8	Sistemico – assorbimento in fase di germinazione per via radicale e del germoglio	monocotiledoni (graminacee) alcune dicotiledoni	pre-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	1,5-3	Giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Isoxaflutole (isoxazolo)	75	0,07-0,12	Sistemico – assorbito dalle infestanti in germinazione o appena emerse per via radicale, dal coleoptile o dall'ipocotile, dall'apice vegetativo delle plantule.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza
	Isoxaflutole e Aclonifen	6,2 41,3	0,7-1,0	Vedi singoli principi attivi.	vedi singoli p.a.	pre-emergenza
	Isoxaflutole e Flufenacet	10 48	0,5-0,7	Vedi singoli principi attivi.	vedi singoli p.a.	pre-emergenza
	Dimetenammide (ammide)	79,65	1,25-1,5	Assorbito prevalentemente dall'ipocotile e dal coleoptile.	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza
	Pendimetalin e Dimetenammide	23 23	3,5-4,5	Vedi singoli principi attivi.	monocotiledoni dicotiledoni	pre-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

Principi attivi consentiti nel diserbo del mais

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Post-emergenza	Rimsulfuron ¹ (sulfonilurea)	25	1 trattamento 0,04-0,06 2 trattamenti 0,03 + 0,03	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Nicosulfuron ¹ (sulfonilurea)	4	1 trattamento 0,8-1,2 2 trattamenti 0,7 + 1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Tifensulfuron-metile ² (sulfonilurea)	75	0,01	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	dicotiledoni	post-emergenza
mais allo stadio di 2-8 foglie	Sulcotriione (trichetone)	26	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare e radicale.	essenzialmente dicotiledoni	post-emergenza
	Mesotriione (trichetone)	9,1	0,5-1	Sistemico - assorbimento principalmente per via fogliare.	essenzialmente dicotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

^ Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Indispensabile l'aggiunta di bagnante.

² in miscela con coadiuvante specifico; non trattare mais dolce, mais vitreo, mais bianco, linee pure di mais da seme, mais di secondo raccolto.

59.3.31 Principi attivi consentiti nel diserbo del girasole

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti^
Pre-semina	Glifosate (fosforganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
Pre-emergenza	Oxadiazon (ossidiazolinoni)	25,5	1,5	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Oxifluorfen (nitroderivato)	23,6	0,5-0,7	Contatto - per via fogliare e dai germinelli.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Pendimetalin (nitroderivato)	31,7	3	giunge a contatto dei semi in germinazione o, nelle infestanti ai primi stadi di sviluppo viene assorbito dalla gemma apicale delle monocotiledoni e dall'ipocotile delle dicotiledoni.	dicotiledoni monocotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Aclonifen (nitroderivato)	49	2	Contatto - agisce principalmente per contatto sull'epicotile delle dicotiledoni	essenzialmente dicotiledoni	pre-emergenza post-emergenza
	Flufenacet (acetammide)	60	0,5-0,8	Sistemico – assorbimento in fase di germinazione per via radicale e del germoglio	monocotiledoni (graminacee) alcune dicotiledoni	pre-emergenza

—segue—

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

Principi attivi consentiti nel diserbo del girasole

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti [^]
Post-emergenza 2-4 foglie vere Post-emergenza dopo le 6 foglie	Imazametabenz ¹ (imidazolinone)	19,2	1,5	sistemico -assorbimento per via fogliare e radicale	monocotiledoni dicotiledoni	post-emergenza
	Cicloxicidim ² (cicloesenone)	21	1	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Fenoxaprop-p-etile ² (fenossiderivato)	6,77	1	Sistemico - assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni	post-emergenza
	Fluazifop-p-butile ² (fenossiderivato)	13,3	1-1,5	Sistemico - assorbimento prevalente per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Haloxyfop-r-methyl estere ² (fenossiderivato)	10,63	0,7	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Propaquizafop ² (fenossiderivato)	9,7	0,8	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Setossidim ² (cicloesenone)	20	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare (circa 1 ora) e per via radicale.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza
	Quizalofop etile isomero D ² (fenossiderivato)	5	1-1,5	Sistemico - rapido assorbimento per via fogliare.	monocotiledoni (graminacee)	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

[^] Gli interventi in pre-emergenza delle infestanti vanno effettuati esclusivamente in maniera localizzata, operando su una striscia di terreno non più larga di 1/3 dell'interfila.

¹ Autorizzato solo in caso di forti infestazioni di crucifere.

² Nella scelta dei graminicidi porre attenzione al periodo di carenza: Cicloxicidim 100 gg.; Fenoxaprop-p-etile 90 gg.; Fluazifop-p-butile 60 gg.; Haloxyfop-r-methyl estere 90 gg.; Propaquizafop 60 gg.; Quizalofop etile isomero D 60 gg.; Setossidim n.c.

59.3.32 Principi attivi consentiti nel diserbo della fragola

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
pre-trapianto	Glifosate (fosfororganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosfororganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

59.4 Il controllo integrato delle infestanti delle colture floricole

Il controllo chimico delle infestanti delle seguenti colture floreali: crisantemo, garofano, gerbera, gladiolo, lily, poinsettia e rosa, potrà essere effettuato esclusivamente con interventi in post-emergenza delle infestanti e solo nella fase di pre-trapianto, utilizzando i principi attivi riportati nella tabella seguente, redatta ai fini del “Programma regionale per l’agricoltura compatibile con l’ambiente” (Reg. Cee 2078/92), a dose piena per una sola volta oppure, quando previsto, a dosi ridotte, sempre che la somma delle dosi utilizzate per ogni intervento non sia superiore alla dose massima consentita.

59.4.1 Principi attivi consentiti nel diserbo del crisantemo, garofano, gerbera, gladiolo, lily, poinsettia, rosa

Periodo di intervento	Principio attivo	% p.a.	Dose di formulato commerciale L-kg/ha*	Modalità di assorbimento e traslocazione	Infestanti controllate	Stadio delle infestanti
Pre-trapianto	Glifosate (fosorganico)	30,4	1,5-3	Sistemico - assorbito principalmente attraverso le parti verdi.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza
	Glufosinate ammonio (fosorganico)	11,33	4-7	Contatto - agisce per contatto sulle parti verdi delle piante.	dicotiledoni monocotiledoni	post-emergenza

* Le dosi indicate si riferiscono ad un ettaro di superficie effettivamente trattata.

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento generale:

Dott. Michele Bianco

- Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA)

Coordinamento tecnico:

Dott.ssa Daniela Carella

Dott. Bruno Danise

- Funzionario SeSIRCA
- Funzionario SeSIRCA

Segreteria di redazione

- Sig.ra Maria Raffaella Rizzo